

Gattung Art	R	K	L	T	Fdr	Gattung Art	R	K	L	T	Fdr
<i>Cis vestitus</i>				6	K	<i>Psylliodes cuprea</i>	1				K
<i>C. alni</i>		1	1		R	<i>Cassida azurea</i>	7				m
<i>Xylopertha retusa</i>	1				K	<i>Enedreutes sepicola</i>			4		G,W
<i>Priobium carpini</i>				1	Ko	<i>Tropideres albirostris</i>			1		G
<i>Anaspis varians</i>	m	2			F,K	<i>Thamnurgus kaltenbachi</i>	3				F,K
<i>Orchesia fasciata</i>			1		R	<i>Apion rufirostre</i>	2				K
<i>Anisoxya fuscata</i>			1		S	<i>A. subulatum</i>	2				K
<i>Lagria atripes</i>				1	K	<i>Otiiorhynchus ligustici</i>			1		Ko
<i>Agapanthia cardui</i>	1				F	<i>O. uncinatus</i>	1				K,Ko
<i>A. violacea</i>			1		W	<i>Sitona ononidis</i>	3				F,K
<i>Phytoecia cylindrica</i>	1				F	<i>Larinus planus</i>	2				G
<i>Ph. coerulescens</i>	1				K	<i>Rhinocyllus conicus</i>	5				G
<i>Hydrothassa marginella</i>			1		W	<i>Leiosoma oblongulum</i>				2	G
<i>Chrysomela oricalcia</i>			1		Ko	<i>Cryptorhynchus lapathi</i>			m		W
<i>Luperus flavipes</i>			1		S	<i>Acalles dubius</i>	m		m		G,W
<i>L. circumfusus</i>	2				F,K	<i>A. echinatus</i>	1				K
<i>Phyllotreta christinae</i>			h		Ko	<i>A. lemur</i>			4		G
<i>Ph. tetrastigma</i>			1		S	<i>Rhinoncus henningsi</i>	1				W
<i>Longitarsus tabidus</i>	2				F,K	<i>Ceutorhynchus atomus</i>	1				Ko
<i>L. membranaceus</i>	1			1	F,K	<i>Mecinus janthinus</i>	2				K
<i>L. pellucidus</i>	1	1			F,K	<i>Gymnetron collinum</i>	1				Ko
<i>Podagrica fuscipes</i>	2				F	<i>Cionus longicollis</i>	4				F,K

Eucinetus meridionalis CAST. - Neu für Deutschland

Von Gerhard Katschak, Kleve

Am 19.07.1988 fing ich an einem sandigen Hang bei Kleve unter einem Buchenast 2 Ex. von *Eucinetus meridionalis* CAST., einer Art, die noch nicht in Deutschland (vgl. HORION, FREUDE-HARDE-LOHSE u.a.) nachgewiesen wurde. Zwei weitere Tiere sind mir nach Eucinetiden-Art - die Art macht purzelnde Bewegungen wie Orchesien und Mordelliden - entkommen. Diese Art, die von BRAKMANN noch nicht aufgeführt wird, wurde mittlerweile auch schon in den Niederlanden gefunden. In der Zeit vom 20.07.88 bis zum 03.09.88 konnte ich weitere kurze Stichproben am gleichen Biotop vornehmen, die Art war immer in einigen Exemplaren vorhanden. Stets auf der Unterseite von Buchenästen, die mehr oder weniger dicht auf sandigem Boden lagen. Insgesamt befinden sich jetzt 10 Exemplare in meiner Sammlung. Es handelt sich hier offenbar um eine doch recht große Population. Ob es sich um eine rezente Einwanderung oder um eine bisher übersehene Art handelt, sollte durch weitere Nachsuche an vergleichbaren Orten und eventuelle weitere Funde geklärt werden.