

Erster Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“

Zusammenfassung Zu dem 1998 erschienenen Verzeichnis der Käfer Deutschlands werden 1.189 Meldungen nachgetragen. Die Gesamtzahl der aus Deutschland mit gesicherten Nachweisen vorliegenden Käferarten erhöht sich auf 6.492.

Summary **First Supplement to the Checklist of the beetles of Germany.** - 1,189 new notifications to the checklist, published in 1998, were added. A total of 6,492 species of beetles have now been reliably recorded from Germany.

1. Einleitung und Dank

Im Jahr 1998 erschien erstmalig seit HORIONS (1951) Käferverzeichnis Mitteleuropas wieder ein aktueller Katalog der Käfer Deutschlands. Das "Verzeichnis der Käfer Deutschlands" (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998) und die zugehörigen Datenbanken mit Quelleneinträgen umfaßten 76.639 Meldungen mit zeitlichem Bezug aus 18 deutschen Regionen. In ausführlichen Darstellungen wird die Datenerhebung und -verarbeitung sowie der Bearbeitungsstand in den einzelnen deutschen Regionen von 20 Autoren beschrieben. Insgesamt konnten 6.479 Käferarten mit gesicherten Nachweisen aus Deutschland aufgeführt werden, weitere 379 Arten wurden als eingeschleppt, als fraglich oder als Falschmeldungen gekennzeichnet.

In der Einleitung des Verzeichnisses wurde unter anderem der Hoffnung Ausdruck verliehen, daß die vorgelegten Listen ein Anstoß sein sollten, eigene Funde bekanntzugeben und weitere Lücken zu schließen. Diesem Wunsch sind viele Kollegen/innen nachgekommen, so daß schon ein Jahr später ein erster umfangreicher Nachtrag erscheinen kann, in dem für so manche Art nicht nur Lücken geschlossen werden, sondern auch ein deutlicheres Verbreitungsbild oder eine Ausbreitungstendenz erkennbar wird. Es ist mir ein herzliches Anliegen mich bei den nachfolgenden Mitarbeitern/innen für ihre Unterstützung zu bedanken:

Volker ASSING, Hannover
 Ulrich BENSE, Mössingen
 Dr. Fritz BRECHTEL, Rülzheim
 Boris BÜCHE, Berlin
 Dietmar EISINGER, Saarbrücken
 Jens ESSER, Berlin
 Günter FLECHTNER, Frankfurt/M.
 Günter HOFMANN, Stockstadt
 Heinz RÖWEKAMP, Ennigerloh
 Monika HESS, München
 Manfred JUNG, Athenstedt

Wilhelm HÖHNER, Erlensee
 Gerhard KATSCHAK, Kleve
 Dr. Ralf KLINGER, Frankfurt/M.
 Wilhelm LUCHT, Langen
 Christian MAUS, Freiburg
 Winrich MERTENS, Freiburg
 Georg MÖLLER, Berlin
 Christoph NEUMANN, Freiburg
 Andreas PÜTZ, Eisenhüttenstadt
 Johannes REIBNITZ, Tamm
 Dr. Klaus RENNER, Bielefeld
 Ulrich SCHAFFRATH, Kassel
 Joachim SCHEUERN, Sinzig
 Andreas SCHMIDT, Wetzlar
 Ludger SCHMIDT, Hannover
 Dr. Peter SPRICK, Hannover
 Wolfgang ZIEGLER, Rondeshagen

2. Methodische Hinweise

Nach Erscheinen des "Verzeichnis der Käfer Deutschlands" (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998) wurden alle Fehlermeldungen, Literaturhinweise und Mitteilungen zu einzelnen Arten gesammelt und in Datenbanken überführt.

Der aktuelle Arbeitsstand wird in Abschnitt 3 zusammengefaßt, in Tabelle 1 finden sich darüber hinaus die bekannten und im weiteren verwendeten Abkürzungen für die regionale Gliederung des Bearbeitungsgebietes und die verwendeten Zeithorizonte beziehungsweise sonstigen Stati der Artmeldungen.

Bekannte Fehler im Verzeichnis, zum Beispiel falsche EDV-Codes oder Namensschreibweisen werden in Abschnitt 4 dargestellt. Entsprechende Korrekturen wurden in den Datenbanken vorgenommen. Dies gilt auch für hier nicht genannte unrichtige Autorennamen und -jahreszahlen oder Klammern. Aktuelle taxonomische Änderungen, soweit sie seit Erscheinen des vierten Supplementes zu dem Werk "Die Käfer Mitteleuropas"

(LUCHT & KLAUSNITZER 1998) vorgenommen wurden, werden aus den im Verzeichnis beschriebenen Gründen auch in diesem Nachtrag nicht aufgeführt. Weitere Artaufspaltungen haben nicht stattgefunden, so daß der faunistische Status bei keiner der betreffenden Arten verändert wurde. Ob und wie, zum Teil kontrovers diskutierte, taxonomische Änderungen in zukünftige Nachträge einfließen sollen, muß noch erörtert werden.

In Abschnitt 5 werden alle neuen Meldungen zu einzelnen Käferarten aufgeführt. Systematik und Nomenklatur folgen dabei dem Verzeichnis. Nach dem Käfernamen werden die Belegdaten in folgendem Schema - soweit bekannt - mitgeteilt: **Region neuer Status** (alter Status): Fundstadt-Ortsteil, Fundort, Finder, Datum, Anzahl und Fundumstände [Quelle]. Liegt mehr als ein Fundort aus einer Region vor, so werden die Fundorte durch Gedankenstriche getrennt. Liegen Nachweise aus mehr als einer Region vor, werden die Regionen alphabetisch aneinandergereiht. Die Reihung (a,b,c) der Quellen orientiert sich am Verzeichnis und entspricht den Datenbankeinträgen. Falls keine anderen Daten genannt werden, sind Finder und Bestimmer identisch und überprüfbare Präparate sind in der Belegsammlung des Finders hinterlegt.

Diese ausführliche Form der Darstellung wurde gewählt, da es sich einerseits vielfach um seltene und gefährdete Käferarten handelt, zu denen nur wenige Veröffentlichungen vorliegen, und um andererseits auch die Arbeit der Beobachter entsprechend zu würdigen. Eine präzise Fundortnennung erscheint mir darüberhinaus auch aus einem anderen Grund bedeutsam: In vielen Publikationen werden immer noch ausschließlich Städte und Dörfer als Fundorte genannt, aber nicht der eigentliche Fundortname (.berg, .tal, .ufer, .wald usw.). Warum leben eigentlich so viele gefährdete und seltene Käferarten in unserer Korrespondenz und Literatur in menschlichen Siedlungen?!

Alle Korrekturen, Käfermeldungen und Quellen wurden in die vorhandenen Datenbanken eingearbeitet, so daß mit Erscheinen dieses Nachtrages auch hier ein Update vorliegt.

3. Arbeitsstand

Für diesen Nachtrag liegen insgesamt 1.195 einzelne Meldungen mit zum Teil mehreren Fundorten je Meldung aus den 18 deutschen Regionen vor. Im wesentlichen handelt es sich hierbei um neue aktuelle Neu- und Wiederfunde aus den Regionen. Auf ganz Deutschland bezogen ergeben sich auf Artniveau aber auch einzelne bedeutsame Änderungen in den Einstufungen, die nachfolgend zusammengestellt werden:

Neufunde für Deutschland

Tychobythinus glabratus (RYE, 1870)
Xylographus bostrychoides (DUF., 1843)
Orthocis linearis (SAHLB., 1901)
Gastrallus knizeki ZAHRADNIK, 1996
Parmena balteus (L., 1767)
Dorytomus puberulus (BOH., 1843)

Wiederfunde für Deutschland nach über 50 Jahren

Colon fuscicornis KR., 1852
Neuraphes coronatus SAHLB., 1881
Ptiliolum sahlbergi FLACH, 1888
Omalius nigriceps KIESW., 1850
Eudectus giraudi REDT., 1858
Mycetoporus brucki (PAND., 1869)
Anthaxia millefolii (F., 1801)
Purpuricenus kaehleri (L., 1758)
Longitarsus australis (MULS.REY, 1874)
Trachyphloeus rectus THOMS., 1865
Cionus olivieri ROSENSCH., 1838

Neu für Deutschland, aber verschollen

Trypocopris pyrenaicus (CHARP., 1825)
Otiorhynchus arcticus (O.F., 1780)

Neue eingebürgerte Adventivarten

Bambara fusca DYBAS, 1966
Clambus simsoni BLACKBURN, 1902

Neue importierte Arten

Cercyon renneri HEBAUER, 1997
Carpophilus obsoletus ER., 1843
Xylotrechus stebbingi GAHAN, 1906
Trichoferus griseus (F., 1792)
Otiorhynchus cribricollis GYLL., 1834
Otiorhynchus meridionalis GYLL., 1834

Bisher fraglich oder falsch, jetzt bestätigt

Elaphropus diabrachys (KOL., 1845)
Atheta volitans BENICK, 1970
Meotica winkleri BENICK, 1954
Malthinus bilineatus KIESW., 1852
Astrapaeus ulmi (ROSSI, 1790) (Ba.)

Bisher nur importiert, jetzt eingebürgert

Athous campyloides NEWM., 1833
Carpophilus quadrisignatus ER., 1843
Latheticus oryzae WTRH., 1880

Für Deutschland jetzt zu streichen

Thinobius atomus AUCT.NEC Fauv., 1869
Nitidula flavomaculata ROSSI, 1790
Leiosoma kirschi GREDL., 1866

Für Deutschland jetzt fraglich

Orthocis pseudolinearis (LOHSE, 1965)
Pityogenes bistridentatus (EICHH., 1879)

Tab. 1: Verteilung der Käferarten auf die 18 deutschen Regionen, Bundesländer und Arbeitsgebiete koleopterologischer Vereinigungen. Zeithorizonte: + = seit 1950, - = vor 1950, ● = vor 1900, Ges. = Summe gesicherter Nachweise. Sonstige Einträge: ? = fraglich, / = Falschmeldungen, v = verschleppt, i = importiert (s. Kap. 2.IV.).

Region / Bundesland	+	-	●	Ges.	?	/	v	i	Summe
Bayern (By)	4907	424	130	5461	52	36	1	22	5572
Württemberg (Wt)	4105	121	31	4257	40	35	3	5	4340
Baden (Ba)	4488	157	19	4664	26	23	1	15	4729
Hessen (Hs)	4200	82	311	4593	50	53	0	21	4717
Pfalz (Pf)	3663	284	107	4054	45	46	5	11	4161
Rheinland (Rh)	3981	233	154	4368	32	139	13	13	4565
Saarland (Sd)	2793	65	0	2858	8	32	1	4	2903
Nordrhein (No)	3873	304	159	4336	58	171	31	41	4637
Westfalen (Wf)	3673	114	468	4255	28	64	3	14	4364
Hannover (Hn)	3376	285	164	3825	39	18	1	12	3895
Weser-Ems-Gebiet (WE)	3120	274	146	3540	75	23	1	20	3659
Niederelbegebiet (Ne)	3719	55	17	3791	13	79	2	23	3908
Schleswig-Holstein (SH)	3715	150	63	3928	56	318	3	88	4393
Mecklenburg-Vorpomm. (MV)	3009	309	219	3537	71	14	6	7	3635
Brandenburg (Br)	3609	467	45	4121	81	34	3	28	4267
Sachsen-Anhalt (St)	3576	746	26	4348	33	13	1	16	4411
Thüringen (Th)	3737	843	44	4624	38	22	0	7	4691
Sachsen (Sn)	3820	398	175	4393	96	13	2	11	4515
Summe Datensätze	67364	5311	2278	74953	841	1133	77	358	77362
Baden-Württemberg	4869	139	22	5030	39	38	4	18	5129
Rheinland-Pfalz	4430	208	125	4763	49	135	12	22	4981
Rheinprovinz	4433	217	123	4773	52	221	35	50	5131
Nordrhein-Westfalen	4213	238	239	4690	46	145	26	44	4951
Niedersachsen	4352	146	115	4613	57	62	1	37	4770
Schleswig-Holst./Niederelbegeb.	4051	83	42	4176	55	327	3	98	4659
Arten Deutschland 1999	6219	211	62	6492	77	125	0	123	6817

Neu im Verzeichnis, aber Falschmeldungen

Coryphium gredleri KR., 1870
Boreaphilus velox HEER, 1838
Gabrius suffragani JOY, 1913
Otolelus pruinosis (KIESW., 1861)
Agapanthia cynarae (GERM., 1817)

Neu im Verzeichnis, aber fraglich

Phyllocrepa scabriuscula (KR., 1858)
Thinobius gilvus FAUVEL, 1899
Atheta viennensis BENICK, 1974
Atheta amblystegii BRUNDIN, 1952
Adosomus roridus (PALL., 1781)

Unter Berücksichtigung der Aktualisierung bereits bestehender Meldungen wächst die Zahl der Einträge von 76.639 auf 77.362, die Zahl der gesicherten Art-nachweise aus Deutschland von 6.479 auf 6.492, von denen 211 Arten seit 1950 (zuvor 219) und 62 (61) Arten seit 1900 verschollen sind. Tabelle 1 gibt den aktuellen Artenbestand der Region, Bundesländer und Arbeitsgebiete koleopterologischer Vereinigungen wieder, Abbildung 1 die Veränderungen seit Erscheinen des Verzeichnisses 1998.

4. Korrekturen und neue EDV-Codes

Fehler in der Namensschreibweise oder im EDV-Code, Ersatz alter Namen mit Seitenzahl im Verzeichnis, EDV-Code, Artname:

047 01-.029-.077-. *Bembidion schuppelii*
051 01-.0633.001-. *Oxypselaphus obscurus*
055 04-.016-.003-. *Nebrioporus depressus* (Potam.)
057 061.000-.000-. **Familie MICROSPORIDAE**
061 10-.024-.006-. *Platysoma angustatum* (ferrug.)
061 10-.0241.001-. *Eblisia minor* (nicht 311.)
062 121.004-.001-. *Pteroloma forstromii*
071 23-.0481.018-. *Anotylus hamatus*
081 23-.113-.0021. *Sepedophilus constans* (stoeckli)
090 23-.204-.008-. *Calodera stiliformis*
098 321.000-.000-. **Familie TROGOSSITIDAE**
107 47-.011-.006-. *Byrrhus luniger* (syn. *lineatus*)
137 88-.023-.0411. *Chrysolina quadrigemina* (Code)
138 88-.0291.001-. *Neophaedon pyritosus* (Code)
138 88-.0292.001-. *Sternoplatus segnis* (EDV-Code)
170 *Ophonus* (statt *Metophonus*)
177 *Anotalus* streichen

Neue Arten und EDV-Codes für Mitteleuropa:

059 09-.003-.0181.	<i>Cercyon renneri</i>
066 21-.0091.001-.	<i>Bambara fusca</i>
072 23-.051-.026-.	<i>Thinobius gilvus</i>
074 23-.055-.1082.	<i>Stenus annulipes</i>
103 381.002-.0011.	<i>Clambus simsoni</i>
107 50-.006-.011-.	<i>Carpophilus obsoletus</i>
120 68-.010-.004-.	<i>Gastrallus knizeki</i>




Abb. 1: Anzahl der gesicherten Käfermachweise 1999 in den 18 deutschen Regionen (Veränderung zu 1998).

5. Nachträge

Familie CARABIDAE

Calosoma maderae (F., 1775)

Hn+: Satemin, WÖLKERLING, 12.VIII.1992, 1 Ex. auf Grasland - Lehrte-Immensen, WÖLKERLING, 15.IX.1992, 1 Ex. auf einem mit Chenopodiaceen stark durchsetzten, sandigen Rübenacker [WÖLKERLING 1998].

Carabus purpurascens F., 1787

Wt+(?): Neckarsulm, ULBRICH, 29.VI.1955, 3 Ex. [HORION 1959].

Carabus nitens L., 1758

Wt+(-): Ulm, Asselfinger Moos, DOLDERER, V. und IX.1958, 2 Ex. an einem Torfstich [HORION 1959].

Carabus linnei PANZ., 1810

Wt+: Weinsberg, LECHNER, 1.XI.1953, 1 Ex. [coll. HAHLBOHM, L. SCHMIDT i.l. 1999].

Blethisa multipunctata (L., 1758)

Ba+: Geisingen, Unterhölzer Wald, KLESS & HÖRSTER, V-VI.1992 in einem Großseggenried [KLESS 1998].

Dyschirius angustatus (AHR., 1830)

Hn+: U. Gronau, Betheln, U. VOIGT, 1997, mehrfach (t. SPRICK) in Bodenfallen [coll. U. VOIGT, L. SCHMIDT i.l. 1999]. **Wf+**(-): Osnabrück, BÜCHE, 8.VI.1991, 1 Ex. an einem Baggersee an einer lehmigen Feinsandböschung - Werther-Isingdorf, Teutoburger Wald, RENNER, 9.V.1998, 1 Ex. im Autokescher [BÜCHE i.l. 1999, RENNER i.l. 1998].

Perileptus areolatus (CREUTZ., 1799)

WE+: Wangerooge, GROTE, 1984, 1 Ex. (det. coll. MAUS) aus Lachmöwen-Speiballen [MAUS 1986].

Epaphius rivularis (GYLL., 1810)

Hn+: St. Andreasberg, HEINRICH & J. SCHMIDT, 2.VIII.1998, 1 Ex. (SPRICK det.) [coll. SPRICK, L. SCHMIDT i.l. 1999].

Elaphropus diabrachys (KOL., 1845)

Ba+(/): Buggingen, Kalihalde, MAUS, III.85, 1 Ex. (det. & coll. SOWIG) [Maus i.l. 1999].

Elaphropus sexstriatus (DUFT., 1812)

Pf+(+): Die Meldung bei PERSOHN & BÜNGENER (1989) beruht auf einer Fehlbestimmung [SCHÜLE & PERSOHN 1997].

Bembidion litorale (OL., 1790)

Wt-(-): Ulm, FORNER, 1901, 3 Ex. in coll. HÜEBER [HORION 1959].

Bembidion ruficollis (PANZ., 1797)

Ne+: Lübbow, ZIEGLER, 17.VIII.1998 [ZIEGLER i.l. 1999].

Bembidion starkii SCHAUM, 1860

Wt-(-): Ulm, FORNER, 1900, 1 Ex. aus Donaugenist in coll. HÜEBER, angeschwemmt? [HORION 1959].

Bembidion cruciatum DEJEAN, 1831

Ba+(?): Grissheim und Weinstetten, Rheinaue, LAU & SZALLIES (t. TRAUTNER) [NEUMANN i.l. 1999].

Bembidion tenellum ER., 1837

Hn+(+): Fehldetermination (SPRICK korr.) [L. SCHMIDT i.l. 1999].

Diachromus germanus (L., 1758)

SH+: Groß Zecher, Schaalsee, WINKLER, VI.1997 [ZIEGLER i.l. 1999]. *Harpalus solitarius* DEJ., 1829

Rh+(/): Taben-Hamm, Saaraue, EINWALLER, 30.V.1997, 1 Ex. (t. KÖHLER) [KÖHLER Taben].

Harpalus marginellus DEJ., 1829

Wt+(-): Urach, KÖSTLIN, VII.1954 [HORION 1959].

Pseudoophonus rufipes (DEGEER, 1774)

MV+: Gothmann, ZIEGLER, 6.VI.1994 [ZIEGLER i.l. 1999].

Pseudoophonus griseus (PANZ., 1797)

MV+: Gothmann, ZIEGLER, 6.VI.1994 [ZIEGLER i.l. 1999].

Pseudoophonus calceatus (DUFT., 1812)

MV+: Gothmann, ZIEGLER, 16.VIII.1994 [ZIEGLER i.l. 1999]. **Wt-**:

Murr, HERRMANN, IV.1900, 1 Ex. in coll. HÜEBER [HORION 1959].

Dicheirotichus rufithorax (SAHLB., 1827)

Wt+: Ulm, Illerauwald, SCHREPFER [HARDE & KÖSTLIN 1965].

Acupalpus brunntipes (STURM, 1825)

Sd+: Nennig, Moselau, DIDION, 15.V.1997, 1 Ex. (coll. EISINGER) in einer Bodenfalle [EISINGER i.l. 1999]. **Wt-**: Heilbronn, 1 Ex. in coll. SCRIBA [HORION 1959].

Acupalpus interstitialis RTT., 1884

Ba+(-): Grissheim, Rheintrockenaue, SZALLIES, 16.V.1997, 1 Ex. (t. TRAUTNER) [NEUMANN i.l. 1999].

Poecilus kugelanni (PANZ., 1797)

Ba+(-): Grissheim, Rheintrockenaue, 1998, mehrfach [NEUMANN i.l. 1999].

Pterostichus aterrimus (HBST., 1784)

Wt-: Ulm, coll. HÜEBER, vor 1900, 3 Ex. [HORION 1959].

Calathus mollis (MARSH., 1802)

Hs?(+): für Hessen fraglich, da Beleg in coll. E. MÜLLER ungeprüft

[HOFMANN i.l. 1998].

Sphodrus leucophthalmus (L., 1758)

Wt+(-): Zwiefaltendorf, STEINER, 18.VIII.1949, 1 Ex. in einem Höhlenkeller [KÖSTLIN 1957].

Sericoda quadripunctata (DEGEER, 1774)

WE+(-): Spiekeroog, MAUS, 20.VII.1987, 1 Ex. [MAUS in Vorber.].

Amara kulti FASS., 1947

Sd+(-): Beaumarais, MAAS, 29.V.1993, 2 Ex. (coll. EISINGER) in einer Bodenfalle [EISINGER i.l. 1999].

Amara anthobia VILLA, 1833

Sd+(-): Saarbrücken, Stadtgebiet, LILLIG, 18.V.1993, 2 Ex. (t. EISINGER) [LILLIG 1998].

Amara crenata DEJ., 1828

Wt+(-): Tübingen, SCHMID, VI.1957 und 26.VIII.1958 - Häfnerhaslach, KÖSTLIN, VI.1954, 1 Ex. - Kornwestheim, KÖSTLIN, VI.1955, 1 Ex. [SCHMID 1965].

Amara convexiuscula (MARSH., 1802)

Sd+(-): Nennig, Baggerweiher, DIDION, 15.V.1997, 1 Ex. (t. EISINGER) unter Stein auf einer Ruderalstelle [coll. DIDION, EISINGER i.l. 1999].

Chlaenius tristis (SCHALL., 1783)

Ba+(-): Markelfingen/Bodensee, HORION u.a., VIII., IX.1949, VIII.1951, 8 Ex. [HORION 1954b].

Oodes gracilis VILLA, 1833

Pf+(-): Eich-Gimbsheim, Altrhein, FLECHTNER, 1984 [FLECHTNER 1984].

Badister meridionalis PUEL, 1925

Hn(+): Fehldetermination (SCHÜLE korr.) [L. SCHMIDT i.l. 1999].

Lebia scapularis (FOURCR., 1785)

Ba+(-): Efringen, HARTMANN, 8.VI.1909, 1 Ex. (t. MAUS) [HARTMANN 1924, coll. Mus. Dresden].

Syntomus pallipes (DEJ., 1825)

Ba+(-): Bad Säckingen, MAASS, 1894, 1 Ex., sicher Falschmeldung [HORION 1941].

Familie HYGROBIDAE

Hygrobia hermanni (F., 1775)

Hs+(-): keine neuen Funde aus Hessen seit 1955 [HORION 1941, FLECHTNER i.l. 1999].

Familie HALIPLIDAE

Haliplus immaculatus GERH., 1877

Sd+(-): Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i.l. 1999].

Haliplus furcatus SEIDL., 1887

Hs+(-): Groß-Gerau, NSG Dachnau, VOGT, 3 Ex., zuletzt 22.VI.1963 (coll. Mus. Frankfurt, t. HOFMANN) [HILLESHEIM-KIMMEL et al. 1978].

Haliplus variegatus STURM, 1834

Hs+(-): Riestadt, Rheininsel-Kühkopf, VOGT, 18.V.1958, 2 Ex. (coll. Mus. Frankfurt, t. HOFMANN) [HOFMANN i.l. 1998].

Familie DYTISCIDAE

Bidessus minutissimus (GERM., 1824)

Wt+(-): Pfullendorf, HENZE, 14.VII.1994, mehrere Ex. in einer Kiesgrube [HENZE 1996].

Hydroporus gyllenhalii SCHDTE., 1841

Hs+(-): diverse Nachweise, coll. BÖHME, HÖHNER, HOFMANN, SCHINDLER [HOFMANN i.l. 1998].

Hydroporus morio AUBÉ, 1836

Th+(-): Oberhof, Saukopfmoor und Crawinkel, Siegelbach, CUPPEN, 19.V.1997, 5 und 1 Ex. [CUPPEN et al. 1998].

Hydroporus longicornis SHP., 1871

Hs+(-): Rhön, Rotes Moor, FRISCH & HÖHNER, 3.III.19 und 2.IV.1994, 5 Ex. [HÖHNER i.l. 1998].

Laccophilus ponticus SHARP, 1882

Hn+(-): Eschede, Quarmbach, WILLERS, 28.IX.1996, 1 Ex. (t. BELLSTEDT) im Uferbereich [coll. WILLERS, L. SCHMIDT i.l. 1999].

Agabus neglectus ER., 1837

Ba+(-): Fischweiher, Albtal, BÜCHE, 24.VIII.1991, 1 Ex. [BÜCHE i.l. 1999].

Agabus nitidus (F., 1801)

Hs+(-): Roßdorf, Roßberg, HÖHNER, 17.IV.1982, 1 Ex. [HÖHNER i.l. 1998].

Agabus congener (THUNB., 1794)

Ba+(-): Fahmau b. Schopfheim/Wiesetal, 4.VII.1897 - Fahler Heide b. Todtnau, 19.V.1898 - Titisee-Neustadt, Schluchsee, omnia HARTMANN leg. - Geisingen, Unterhölzer Wald, KLESS, V-VI.1992 [KLESS 1998, HARTMANN 1926].

Agabus undulatus (SCHRR., 1776)

Sd+(-): Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i.l. 1999].

Nartus gratii (GYLL., 1808)

Hs+(-): Hanau, HÖHNER, 15.X.1983 und 21.IX.1984, 5 Ex. [HÖHNER i.l. 1998].

Rhantus suturellus (HARR., 1828)

Ba+(-): Hartheim, Rheintrockenaue, Finder unbekannt [NEUMANN i.l. 1999].

Dytiscus circumcinctus AHR., 1811

Hs+(-): Seligenstadt, Froschhausen, SCHROTH, 6.VIII.1978, 1 Ex. (coll. HÖHNER) [HÖHNER i.l. 1998].

Cybister lateralimarginalis (DEGEER, 1774)

Ne+(-): Kaltenhof, HENGMITH, 9.V.1998 [ZIEGLER i.l. 1999].

Familie GYRINIDAE

Gyrinus caspius MENETR., 1832

WE+(-): Spiekeroog, MAUS, 22.VII.1987, 1 Ex. (t. PANKOW) [MAUS in Vorber.].

Familie HYDRAENIDAE

Hydraena rufipes CURT., 1830

Wt+(-): Kirchberg, Scherrbach, BUCK, VIII. vor 1957 [HORION 1960b].

Hydraena belgica D'ORCH., 1930

Hs+(-): Odenwald, VOGT, 8.VIII.1959 und 22.VIII.1959, 3 Ex. (HOCH det., LOHSE det., coll. HÖHNER) [HÖHNER i.l. 1998].

Ochthebius exsculptus GERM., 1824

Ba+(-): Istein, Rheinaue, NEUMANN, VIII.98, zahlreich (t. PANKOW) an den Felsen der Isteiner Schwellen, knapp unter der Wassergrenze [NEUMANN i.l. 1999].

Limnebius papposus MULS., 1844

Hs+(-): Wiesbaden-Schierstein, Finder?, 30.IV.1923, 1 Ex. (coll. HÖHNER) [HÖHNER i.l. 1998].

Limnebius aluta BEDEL, 1881

No+(-): Kleve, SCHARF, 18.II.1998, 1 Ex. (coll. RÖWEKAMP, t. RENNER) [RÖWEKAMP & RENNER i.l. 1998].

Limnebius atomus (DUFT., 1805)

Hs+(-): Groß-Gerau, HÖHNER, 25.IX.1982 und 30.IV.1983, 5 Ex. [HÖHNER i.l. 1998].

Familie HYDROCHIDAE

Hydrochus elongatus (SCHALL., 1783)

Ba+(-): Nußdorf/Bodensee, HORION, IV.1945, aus feuchtem Genist am Bodenseeufer [HORION 1954b]. **Sd+(-):** Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i.l. 1999].

Hydrochus brevis (HBST., 1793)

Ba+(-): Karlsruhe-Hafen, Rheinaltwasser Schleiert, BÜCHE, 18.IV.1988 [BÜCHE i.l. 1999].

Hydrochus angustatus GERM., 1824

Pf+(-): Schaidt, NWR Mörderhäufel, KÖHLER, 28.VI.1996, 6 Ex. im Autokescher [KÖHLER Bienwald].

Familie HYDROPHILIDAE*Helophorus aequalis* THOMS., 1868**Hs+**: Kinzigäue, ERPELDING, diverse Funde (t. HOFMANN) [ERPELDING 1998].*Helophorus arvernicus* MULS., 1846**Hs+**: Fuldaufer, MARTEN [MARTEN 1983].*Helophorus dorsalis* (MARSH., 1802)**Ne+**: Forst Landwehr, Grippel, ZIEGLER, 21.VI.1998 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].*Helophorus paraminutus* ANGUS, 1986**Th+**: Immelborn, Werratal, CUPPEN, 23.V.1997, 3 Ex. (ANGUS det.) [CUPPEN et al. 1998].*Sphaeridium marginatum* F., 1787**WE+**: Spiekeroog, MAUS, mehrere Nachweise [MAUS in Vorber.].*Cercyon littoralis* (GYLL., 1808)**MV+**: Salzhaff, JUNG, 1988, zahlreich unter Tang [JUNG i.l. 1999].*Cercyon marinus* THOMS., 1853**Sd+**: Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i.l. 1999].*Cercyon bifenestratus* KÜST., 1851**Sd+**: Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i.l. 1999].*Cercyon laminatus* SHP., 1873**MV+**: Duvennest, ZIEGLER, 8.VIII.1996 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].*Cercyon granarius* ER., 1837**WF+**(.): Medebach-Berge, Orketal, RÖWEKAMP, 1.VI.19??, 1 Ex. (t. RENNER) [RÖWEKAMP & RENNER i.l. 1998].*Cercyon renneri* HEBAUER, 1997**Wf**: Werther-Isingdorf, Teutoburger Wald, RENNER, 30.X.1984, 1 Ex. im Autokescher [HEBAUER 1997].*Cryptopleurum subtile* SHP., 1884**Br+**(-): Eisenhüttenstadt, LSG Diehloer Berge, PÜTZ, 6.VIII.1983, 1 Ex. aus Wasserpfanzenresten gesiebt [PÜTZ 1984b].*Limnoxenus niger* (ZSCHACH, 1788)**Sd+**: Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i.l. 1999].*Laccobius obscuratus* (ROTT., 1874)**Pf+**: Fischbach, Staatsforst, KÖHLER, 21.VI.1998, 1 Ex. im Autokescher [coll. KÖHLER].*Laccobius atratus* (ROTT., 1874)**Hn+**: Harz, Schalke, M. KOCH, 28.IX.1997, 4 Ex. (HOFMANN det.) in einem Quellmoor [HOFMANN i.l. 1998].*Helochaeres punctatus* SHP., 1869**Ba+**: Hotzenwald, Horbacher Moor, MERTENS, 27.IX.1997, 2 Ex. aus einem Moortümpel [MERTENS i.l. 1999].*Enochrus halophilus* (BEDEL, 1878)**Th+**: Herbsleben, Sandgrube, CUPPEN, V.97, 4 Ex. (t. SCHÖDL) [CUPPEN et al. 1998].*Chaetarthria similis* WOLL., 1864**Hs+**: Heusenstamm, SCHINDLER, 20.IV.1962, 1 Männchen (HOFMANN det. gen.) an einem Sandgrubenufer [HOFMANN i.l. 1998]. **Th+**: Immelborn, Werratal, CUPPEN, 23.V.1997, 21 Ex. [CUPPEN et al. 1998].*Berosus bispina* REICH.SAULCY, 1856**Pf+**: Vinningen, MOSBACHER, 19.X.1995, 1 Ex. in einer Mardelle [coll. MOSBACHER, EISINGER i.l. 1999].**Familie HISTERIDAE***Plegaderus saucius* ER., 1834**Ba+**: Freiburg-Ebringen, Schönberg, NEUMANN, 17.IV.1992, 1 Ex. unter Fichtenrinde [NEUMANN i.l. 1999].*Abraeus parvulus* AUBÉ, 1842**WF+**: Enniger, RÖWEKAMP, 1.XII.1996, 1 Ex. (t. RENNER) [RÖWEKAMP & RENNER i.l. 1998].*Acritus komai* LEWIS, 1879**Hn+**: Rodewald, HAHLBOHM, 1.VIII.1993, 1 Ex. im Autokescher [coll. HAHLBOHM, L. SCHMIDT i.l. 1999]. **SH+**: Rondeshagen, ZIEGLER, 12.IX.1981 [ZIEGLER i.l. 1999].*Gnathoncus nannetensis* (MARS., 1862)**Hs+**: Hanau, Kleine Bulau, HÖHNER, 10.VIII.1970, 3 Ex. an Taubenmistküder, weitere Funde [HÖHNER i.l. 1998].*Saprinus lautus* ER., 1839**Ne+**: Hamburg, Hohe Schaar, HERRMANN, 12.VI.1997 [ZIEGLER i.l. 1999].*Hypocaccus rugiceps* (DUFT., 1805)**No+**(-): Xanten, NSG Bislicher Insel, MÜLLER & REISSMANN, 6.VI.19 und 13.VI.1998, 25 Ex. auf einer offenen Sandfläche in Gewässernähe [MÜLLER & REISSMANN 1998].*Dendrophilus pygmaeus* (L., 1758)**MV+**(-): Pritzier, ZIEGLER, 4.I.1999 [ZIEGLER i.l. 1999].*Hololepta plana* (SULZER, 1776)**Rh+**: Andernach, NAMEDYER Wert, NEUMANN, 1993-1995, mehrfach unter Pappelrinde [NEUMANN i.l. 1999].*Onthophilus punctatus* (MÜLLER, 1776)**Sd+**: Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i.l. 1999].*Margarinotus purpurascens* (HBST., 1792)**Hs+**: Erlensee, HÖHNER, 15.VI.1969, 4 Ex., weitere Funde [HÖHNER i.l. 1998]. **MV+**(-): Gothmann, ZIEGLER, 18.VIII.1994 [ZIEGLER i.l. 1999].*Margarinotus ventralis* (MARS., 1854)**MV+**(-): Gothmann, ZIEGLER, 18.VIII.1994 [ZIEGLER i.l. 1999].*Hister quadrimaculatus* L., 1758**St+**(-): Freyburg/Unstrut, LAU LSA, 1996, zahlreich (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i.l. 1999].*Hister helluo* TRUQUI, 1852**Rh+**(-): Taben-Rodt, Saaraue, MATERN, 10.VII.1997, 20 Ex. [KÖHLER Taben].*Hetaerius ferrugineus* (OL., 1789)**Hn+**(-): Wesseln, NSG Steinberg, HONDELMANN, 25.IV.1998, 1 Ex. [coll. L. SCHMIDT].**Familie SPHAERITIDAE***Sphaerites glabratus* (F., 1792)**Rh+**: Welschneudorf, NWR Stelzenbach, KÖHLER, 9.V.1998, 1 Ex. im Autokescher [KÖHLER Stelzenbach]. **St+**: Altenbrak/Harz, LAU LSA, 1997, 5 Ex. (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i.l. 1999].**Familie SILPHIDAE***Necrophorus sepultor* CHARP., 1825**Wt+**: Oberstotzingen, DOLDERER, VII.51/52, 4 Ex. [HORION 1960b].*Necrophorus vestigator* HERSCHEL, 1807**Ba+**: Oberrotweil/Kaiserstuhl, WOLF, 14.X.1959, 1 Ex. (t. MAUS) [WOLF 1963].*Silpha obscura* L., 1758**St+**(-): Eisleben, Salziger See, LAU LSA, 1997, zahlreich (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i.l. 1999].*Silpha tyrolensis* LAICH., 1781**Ba+**: Wutachschlucht [ROPPEL 1990].**Familie AGYRTIDAE***Agyrtes bicolor* CAST., 1840**St+**(-): Freyburg/Unstrut, Tote Täler, PIETSCH, 1995, 1 Ex. in Bodenfallen [JUNG i.l. 1999].**Familie LEPTINIDAE***Leptinus testaceus* MÜLL., 1817**St+**(-): Altenbrak/Harz, LAU LSA, 1997/98, 7 Ex. (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i.l. 1999].

Familie CHOLEVIDAE

Choleva septentrionis JEANN., 1923

Wf+: Bad Meinberg-Horn, Hohlsteinhöhle, SOKOLOWSKI IV-V.56, 5 Ex.; IPSEN & TOLASCH 7.II.1996, 28 Ex. [IPSEN & TOLASCH 1997].

Choleva nivalis (KR., 1856)

Ba+: Belchen-Nordhang, 1100m, BAUM, VIII.? - Wutachschlucht, ROPPEL - Zastlertal, Präg, MOLENDEN [BAUM 1989, ROPPEL 1990, MOLENDEN 1996].

Choleva angustata (F., 1781)

St+(-): Timmenrode/Quedlinburg, LAU LSA, 1995/97, 2 Ex. (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i.l. 1999].

Choleva sturmi BRIS., 1863

St+?: Altenbrak/Harz, LAU LSA, 1997, 1 Ex. (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i.l. 1999].

Choleva jeanneli BRITT., 1922

Sd+: Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i.l. 1999].

St+?: Wittenberg, PFEIFFER, 1991, 1 Ex. [JUNG i.l. 1999].

Familie COLONIDAE

Colon clavigerum HBST., 1797

St+: Timmenrode/Quedlinburg, LAU LSA, 1995/96, zahlreich (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i.l. 1999].

Colon fuscicorne KR., 1852

St+(-): Timmenrode/Quedlinburg, LAU LSA, 1995, 1 Ex. (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i.l. 1999].

Colon armipes KR., 1854

St+(-): Timmenrode/Quedlinburg, LAU LSA, 1995/96, zahlreich (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i.l. 1999].

Colon angulare ER., 1837

Hs+(-): Rudingshain, NWR Niddahänge, FLECHTNER, 1990-92 [FLECHTNER et al. 1999].

Colon zebei KR., 1854

Ba+: Grissheim, Rheintrockenaue, SZALLIES, 16.V.1997, 1 Ex. im Autokescher [NEUMANN i.l. 1999]. **Hs+(-):** Rudingshain, NWR Niddahänge, FLECHTNER, 1990-92 [FLECHTNER et al. 1999].

Colon barnevillei KR., 1858

Ba+: Grenzach-Wyhlen, SCHILLER, 31.VI.1978, 1 Ex. gestreift [SCHILLER 1979b].

Colon brunneum (LATR., 1807)

Ba+: Grissheim, Rheintrockenaue, SZALLIES, 28.VII.96, 10.VI.97 und 9.VII.97, im Autokescher [NEUMANN i.l. 1999]. **Hs+(-):** Rudingshain, NWR Niddahänge, FLECHTNER, 1990-92 [FLECHTNER et al. 1999].

Colon calcaratum ER., 1837

Ba+: Grenzach-Wyhlen, SCHILLER, 23.VII.1978, 1 Ex. gestreift - Grissheim, Rheintrockenaue, SZALLIES, 28.VII.1996 und 10.VI.1997, je 1 Ex. [SCHILLER 1979b, NEUMANN i.l. 1999].

Colon serripes (SAHLB., 1822)

St+: Eisleben, Salziger See, LAU LSA, 1997, zahlreich (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i.l. 1999].

Familie LEIODIDAE

Triarthron maerkelii MÄRK., 1840

MV+(-): Testorfer Holz, Zarentin, ZIEGLER, 28.V.1994 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Hydnobius multistriatus (GYLL., 1813)

Ba+: Überlingen/Bodensee, VOGT, IV.1951, 1 Ex. abends gekeschert [HORION 1954b]. **St+(-):** Athenstedt, JUNG, 1971, 1 Ex. [JUNG i.l. 1999].

Leiodes rugosa STEPH., 1829

SH+(-): Treuholz, Barnitz, ZIEGLER, 28.X.1998 [ZIEGLER i.l. 1999].

Leiodes hybrida (ER., 1845)

Ba+(-): Überlingen/Bodensee, VOGT, IV.1951, 1 Ex. abends gekeschert [HORION 1954b].

schert [HORION 1954b].

Leiodes oblonga (ER., 1845)

Hs+(-): Rudingshain, NWR Niddahänge, FLECHTNER, 1990-92 [FLECHTNER et al. 1999]. **St+(-):** Athenstedt, JUNG, 1998, 4 Ex. in Bodenfallen [JUNG i.l. 1999].

Leiodes flavescens (SCHM., 1841)

Wt+: Lonetal, VI.1932, 1 Ex. - Stetten o.L., VIII.1951, 1 Ex. [HORION 1960b].

Leiodes picea (PANZ., 1797)

Wt+: Ramminger Moos, V.1921, 1 Ex. [HORION 1960b].

Leiodes rufipennis (PAYK., 1798)

Ba+: Schwetzingen, Dünengebiet Hirschacker/Dossenwald, BÜCHE, 10.VI.1992, 1 Ex. auf einem Sandtrockenrasen gekeschert [BÜCHE i.l. 1999].

Leiodes brunnea (STURM, 1807)

St+(-): Timmenrode/Quedlinburg, LAU LSA, 1995, 1 Ex. (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i.l. 1999]. **WE+:** Spiekeroog, MAUS, 10.VIII.1987, 1 Ex. (DAFFNER det.) [MAUS in Vorber.].

Leiodes nigrita (SCHM., 1841)

Wt+: Lonetal, VI.1931, 1 Ex. - Oberstotzingen, VII.1951, 1 Ex. - Dettingen b. Tübingen, BERNHARD, VII.1992, 1 Ex. [BRITZ & BERNHARD 1994].

Leiodes gyllenhali STEPH., 1829

Ba+: Todtnau, Feldberg, Horion, 50er Jahre [HORION 1960b].

Leiodes strigipenne DAFFNER, 1983

Pf+(-): Fischbach, Staatsforst, 21.VI.1998, 1 Ex. im Autokescher [coll. KÖHLER].

Colenis immunda (STURM, 1807)

Hs+(-): Frankfurt, Berger Hang, HÖHNER, 1.IV.1978, 1 Ex. und weitere Funde [HÖHNER i.l. 1998].

Liocyrtusa minuta (AHR., 1812)

Ba+: Berghausen, Ziegeleigrube, BÜCHE, 21.VII.1984, 1 Ex. auf einem Halbtrockenrasen gekeschert [BÜCHE i.l. 1999].

Liocyrtusa minuta (AHR., 1812)

St+(-): Hohenmölsen, PIETSCH, 1997, 1 Ex. in Bodenfallen [JUNG i.l. 1999].

Liocyrtusa vittata (CURT., 1840)

St+(-): Athenstedt, JUNG, 1998, 1 Ex. [JUNG i.l. 1999]. **Wt+:** Hohenhaslach bei Vaihingen, KÖSTLIN, VII.1958, 1 Ex. bei Sonnenuntergang gekeschert [HORION 1960b].

Liodopria serricornis (GYLL., 1813)

Sn+: Rohrbach, Wald östl. NSG, BENSE, 19.VI.1997, 6 Ex. [BENSE 1998]. **Wf+:** Werther-Isingdorf, Teutoburger Wald, RENNER, 20.VI.1998, 1 Ex. im Autokescher [RENNER mdl. Mitt.].

Agathidium convexum SHP., 1866

St+: Hottendorf, LAU LSA, 1996, 1 Ex. in Bodenfallen [JUNG i.l. 1999].

Agathidium bescidicum RTT., 1884

Wt+: Tübingen, Spitzberg, MEYER, VIII.1952-54, 1 Ex. aus feuchtem Eichenlaub gesiebt [MEYER 1966].

Agathidium rotundatum (GYLL., 1827)

St+?: Athenstedt, JUNG, 1998, zahlreich [JUNG i.l. 1999].

Agathidium confusum BRIS., 1863

Hs+: Rudingshain, NWR Niddahänge, FLECHTNER, 1990-92 [FLECHTNER et al. 1995].

Familie SCYDMAENIDAE

Euthia plicata (GYLL., 1813)

Ba+: Lindau, oberer Hotzenwald, SZALLIES & MERTENS, 6 Ex. in der Bodenstreu an einem *Formica exsecta*-Nest [SZALLIES 1998].

Euthia linearis MULS., 1861

Wt+: Stuttgart und Heidelberg, SCRIBA, vor 1911 [HORION 1960b].

Euthia scydmaenoides STEPH., 1830

Ba+: Grissheim, Rheintrockenaue, SZALLIES, 6.V.1995, 1 Ex. - Grissheim, Rheinufer, NEUMANN, VIII.98, 1 Ex. [NEUMANN i.l. 1999].
By+(-): Falkenstein, Rettenbach, RENNER 5.VI.1998, 1 Ex. im Autokescher [RENNER i.l. 1999].
Neuraphes carinatus (MULS., 1861)
Ba+: Karlsruhe, Hardtwald, Hagsfelder Eichen, BÜCHE, 7.III.1988, 1 Ex. aus der Bodenstreu gesiebt [BÜCHE i.l. 1999].
Neuraphes coronatus SAHLB., 1881
Ba+(-): Belchen-Gebiet, BAUM, mehrere Funde [BAUM 1989].
Scydmoraphes sparshalli (DENNY, 1825)
Pf+: Ludwigswinkel, Saarbachtal, KÖHLER, 14.V.1998, 1 Ex. im Autokescher [coll. KÖHLER]. **St+**(-): Timmenrode/Quedlinburg, LAU LSA, 1995, 1 Ex. (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i.l. 1999].
Scydmoraphes minutus (CHAUD., 1845)
SH+: Fitzen, ZIEGLER, 7.IX.1998 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].
Stenichnus pusillus (MÜLL.KUNZE, 1822)
Ba+(-): Grissheim, Rheintrockenaue, SZALLIES, 18.X.1994, 1 Ex. im Mulm einer hohlen Pappel [NEUMANN i.l. 1999].
Stenichnus godarti (LATR., 1806)
Ba+: Karlsruhe, Stutensee, NOWOTNY, VI.1949, 1 Ex. - Karlsruhe, Beiertheimer Wäldchen, NOWOTNY, III.1951, 2 Ex. - Berghausen, BÜCHE, 3.IV.1989, 1 Ex. - Karlsruhe-Grötzingen, Bruchwald, BÜCHE, 20.IV.1986, 1 Ex. in hohler Pappel [NOWOTNY 1951, BÜCHE i.l. 1999].
Microscydmus nanus (SCHAUM, 1844)
Pf+(-): Schaidt, NWR Mörderhäufel, KÖHLER, 27.V.1997, 1 Ex. aus bemoosten Rinden am Fuß einer toten Alteiche [KÖHLER Bienwald].
Microscydmus minimus (CHAUD., 1845)
Sd+: Saarbrücken, Saarkohlenwald, MÖLLER, VIII.1998, mehrfach am Fuß von Buchenuinen [MÖLLER i.l. 1999]
Euconnus claviger (MÜLL.KUNZE, 1822)
Ba-: Fahnau bei Schopfheim/Wiesetal, HARTMANN, 6.VIII.1910, mehrere Ex. bei *Formica* [HARTMANN 1926].
Euconnus pragensis (MACH., 1923)
Ba+: Karlsruhe, Stutensee, NOWOTNY, VI.1948, 1 Ex. bei *Lasius brunneus* - Karlsruhe, Hardtwald-Wildpark, BÜCHE 21.I.1989, 2 Ex. am Stammfuß einer alten Buche bei *Lasius brunneus* [NOWOTNY 1951, BÜCHE i.l. 1999].
Euconnus unicus FRANZ, 1957
Ne+: Holtorfsloh, MEYBOHM, 15.VIII.1993 [ZIEGLER i.l. 1999].
SH(+): Eintrag wurde mit Ne vertauscht [ZIEGLER i.l. 1999].
Euconnus denticornis (MÜLL.KUNZE, 1822)
St+(-): Weischütz/Unstrut, LAU LSA, 1996, 2 Ex. (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i.l. 1999].
Euconnus rutilipennis (MÜLL.KUNZE, 1822)
Ba.: Viernheim bei Mannheim, FÖRSTER, 21.III.1894, mehrere Ex. [HARTMANN 1926].
Euconnus hirticollis (ILL., 1798)
St+(-): mehrere Fundorte, LAU LSA, 1997, zahlreich (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i.l. 1999].

Familie PTILIIDAE

Nossidium pilosellum (MARSH., 1802)
Ba+: Bad Boll, Wutachgebiet, KLESS, VI. und VII.1957, zahlreich aus faulen Baumschwämmen - Horberloch, BÜCHE, 18.X.1991 - weitere Fundorte: Freiburg-Ebringen, Grissheim, Weinstetten - Geisingen, Unterhölzer Wald, KLESS, V-VI.1992 [KLESS 1998, 1959, BÜCHE i.l. 1999]. **Sn+**: Leipzig, Löbnig-Dölitz, Leinegraben, SPRICK, VI.95, 4 Ex. Bodenfallenfang im Mulm einer alten, hohlen Kopfpappel [coll. SPRICK, L. SCHMIDT i.l. 1999].
Ptenidium gressneri ER., 1845
Ba+: Belchen, 1000m, SCHILLER, VII.?, 4 Ex. aus hohler Weidbuche - Karlsruhe, Elnforgenbruch, BÜCHE & NEUMANN, zahlreich 4.XI.1990

bei *Lasius fuliginosus* - Karlsruhe, Hardtwald-Wildpark, BÜCHE, 16.XII.1990, mehrere Ex. in weißfaulem Eichenholz bei *Lasius brunneus* [BAUM 1989, BÜCHE i.l. 1999].
Ptenidium laevigatum ER., 1845
Ba+: Karlsruhe, Oberwald, BÜCHE, 15.I.1990, aus Laub gesiebt, zuvor schon mehrfach in der Umgebung von Karlsruhe [BÜCHE i.l. 1999].
Ptenidium turgidum THOMS., 1855
SH+: Seedorf, Schaalsee, ZIEGLER, 25.VI.1998 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].
Ptenidium fuscicornis ER., 1845
St+(-): Schollene, LAU LSA, 1996, 3 Ex. (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i.l. 1999].
Ptenidium punctatum (GYLL., 1827)
Ne+: Seeveniederung, BURGARTH, 25.VI.1994 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].
Oligella foveolata (ALLIB., 1844)
Ba+: Müllheim-Niederweiler, NEUMANN, III.91, zahlreich [NEUMANN i.l. 1999].
Ptilium affine ER., 1845
MV+(-): Röggegeliner Holz, ZIEGLER, 27.VI.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].
Ptilium myrmecophilum (ALLIB., 1844)
Ba+: Ennersbacher Moor, SZALLIES, 18.VIII.1996, 2 Ex. - Freiburg-Ebringen, Schönberg, NEUMANN, 6.IV.1997, zahlreich - Grissheim, Rheintrockenaue, NEUMANN, 22.III.1997, zahlreich [MERTENS i.l. 1999].
Ptilium modestum WANK., 1869
Ba+: Grissheim, Rheintrockenaue, NEUMANN, 25.X.1998, zahlreich (t. KÖHLER) in einer hohlen Buche bei *Lasius fuliginosus* - Müllheim-Niederweiler, NEUMANN, III.91, zahlreich [NEUMANN i.l. 1999].
Eurypitium saxonicum (GILLM., 1845)
Hs+: Neuhof, NWR Schönbuche, FLECHTNER, 1990-92 [DOROW et al. im Druck].
Ptiliolum schwarzi (FLACH, 1887)
By+(-): Rohrbrunn, Rohrberg, KÖHLER, 30.VIII.1998, 2 Ex. aus faulen Pilzen gesiebt [coll. KÖHLER].
Ptiliolum fuscum (ER., 1845)
Wt+: Tübingen, Spitzberg, MEYER, IV.1952-54, 1 Ex. aus trockenem Stallmist in Weinberg [MEYER 1966].
Ptiliolum sahlbergi FLACH, 1888
Ba+: Ibach, Himiwald, SZALLIES & MERTENS, 11.VIII.1997, 3 Ex. im Autokescher [SZALLIES 1998].
Bambara fusca DYBAS, 1966
Ne+: Holtorfsloh, MEYBOHM, 21.VIII.1997 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999]. **SH+**: Forst Beimoor, MEYBOHM, 3.VIII.1998 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].
Pinella aptera (GUER., 1839)
Ba+: Karlsruhe, Oberwald, BÜCHE, 11.II.1990, zahlreich bei *Lasius brunneus* in einer alten Eiche - weitere Fundorte: Karlsruhe, Hardtwald - Müllheim-Niederweiler - Freiburg-Ebringen - Grissheim, Rheintrockenaue [BÜCHE i.l. 1999, NEUMANN i.l. 1999].
Pinella tenella (ER., 1845)
Rh+: Welschneudorf, NWZ Stelzenbach, KÖHLER, 11.VII.1998, 1 Ex. in einer Fensterfalle [KÖHLER Stelzenbach].
Pinella errabunda JOHNS., 1975
SH+: Forst Beimoor, MEYBOHM, 9.VIII.1998 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].
Nephanes titan (NEWM., 1834)
Ba+: Überlingen, HORION, VII.-IX. ohne Jahr, aus Kompost etc. [HORION 1954b].
Baeocrara variolosa (MULS.REY, 1867)
Ba+(-): Freiburg-Schladt, Mooswald, NEUMANN, 2.III.1997, 1 Ex. [NEUMANN i.l. 1999]. **Hn+**: Rodewald, Lichtenheide, HAHLBOHM,

18.IX.1997, 1 Ex. [coll. HAHLBOHM, L. SCHMIDT i.l. 1999].

Baeocera japonica (MATTH., 1884)

Hs+: Schlichtern, Kinzigau, FLECHTNER, 13.IX.1997, 5 Ex. in altem Heu [FLECHTNER i.l. 1999]. **Ne+**: Amt Neuhaus, Strachau, ZIEGLER, 12.VIII.1998 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Acrotichis silvatica ROSSK., 1935

Ba+(-): Karlsruhe-Neureut, Rheinwald, BÜCHE, 8.XI.1993 [BÜCHE i.l. 1999].

Acrotichis sjoeborgi SUNDT, 1958

Ba+: Überlingen, HORION? [BESUCHET & SUNDT 1971].

Familie STAPHYLINIDAE

Siagonium humerale GERM., 1817

Hs+: Frankfurt, Enkheimer Wald, 6.IX.1997, 1 Ex. unter saftfrischer Rinde einer starken entwurzelten Hainbuche [FLECHTNER i.l. 1999].

Megarthus nitidulus KR., 1858

Pf+: Fischbach, Staatsforst, 21.VI.1998, 35 Ex. im Autokescher [coll. Köhler]. **Sd+**: Saarbrücken, Saarkohlenwald, MÖLLER, VIII.1998, im Autokescher [MÖLLER i.l. 1999].

Proteinus atomarius ER., 1840

Sd+: Saarbrücken, Saarkohlenwald, MÖLLER, VIII.1998, 2 Ex. an faulenden Holzpilzen [MÖLLER i.l. 1999].

Micropeplus tessera CURT., 1828

MV+: Röggliner Holz, ZIEGLER, 27.VI.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Eusphalerum montivagum (HEER, 1838)

Pf+: Ludwigswinkel, Saarbachtal, KÖHLER, 14.V.1998, 1 Ex. im Autokescher [coll. KÖHLER].

Eusphalerum sorbi (GYLL., 1810)

MV+: Testorfer Holz, Zarentin, ZIEGLER, 28.V.1994 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999]. **Pf+(-)**: Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 15.V.1998, 3 Ex. in Flugfallen [KÖHLER Mummelskopf].

Acrolocha amabilis (HEER, 1838)

Hn+(-): Elliehäuser, Börtal, WILLERS, 27.IX.1992, 1 Ex. (ZERCHÉ det.) in einem Buchenhochwald an Pilzen [coll. WILLERS, L. SCHMIDT i.l. 1999].

Phyllocrepa scabruscula (KR., 1858)

Ba?: Ibach, Hirnwald, SZALLIES, 10.X.1995, 1 Ex. (nicht revidiert) unter verpilzter Fichtenrinde [SZALLIES 1998].

Phyllocrepa ioptera (STEPH., 1834)

MV+: Testorfer Holz, Zarentin, ZIEGLER, 28.V.1994 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Hypopycna rufula (ER., 1840)

Ne+: Amt Neuhaus, Strachau, ZIEGLER, 16.IX.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Omalius septentrionis THOMS., 1856

Wt+: Seeburg bei Urach, KÖSTLIN, IX.1959 [HORION 1961b].

Omalius exiguum GYLL., 1810

Pf+(-): Ludwigswinkel, Saarbachtal, KÖHLER, 14.V.1998, 1 Ex. im Autokescher [coll. KÖHLER].

Omalius nigriceps KIESW., 1850

Ba+: Feldberggebiet, 1200-1300 m, mehrere Funde [HORION 1954].

Phloeonomus minimus (ER., 1839)

Ba-: Überlingen, HORION, VIII.1943, 1 Ex. aus Fichtenrinden-Abfall [HORION 1954b].

Xylodromus depressus (GRAV., 1802)

Ba+: Karlsruhe, Oberwald, BÜCHE, 5.XI.1992, 1 Ex. aus Wurzelnischen alter Laubbäume gesiebt [BÜCHE i.l. 1999].

Xylodromus testaceus (ER., 1840)

Wt+: Tübingen, Spitzberg, MEYER, X.1952-54, 1 Ex. aus Buchenstammmoos [MEYER 1966].

Phyllocrepoidea crenata (GRAV., 1802)

Ba+: Belchengebiet, BAUM, mehrere Funde 1980-82 [SCHILLER 1989].

Olophrum alpinum (HEER, 1838)

Ba+: Todtnau, Feldberg, WOLF, VII.1958, 1 Ex. in der Gipfelregion (1450m) an einem Quelltümpel [HORION 1961b]. **Wt+**: Bad Waldsee, SZALLIES, 2.IV.1997, 1 Ex. in einem Feuchtwald aus Bodenstreu [SZALLIES 1998].

Lesteva luctuosa FAUV., 1869

Ba+: Oberried, Zastleral, KARDASCH, VII.1950, 1 Ex. aus überrieseltem Moos [HORION 1961b].

Lesteva pubescens MANNH., 1830

Pf+(-): Ludwigswinkel, Mummelseeabfluß, KÖHLER, 17.V.1998, 8 Ex. [coll. KÖHLER].

Eudectus giraudi REDT., 1858

By+(-): Mitterteich, NWR Gitschger, KÖHLER, 25.VI.1998, mehrfach am Fuß alter Bergahorne [KÖHLER Oberpfalz]. **Hn-**: Wesergebirge, Stüntel, SCHRAMM, VII.38 aus Erlenästen gezogen [HORION 1963].

Hs+: Rhön, Weihersberg, HINTERSEHER, 27.X.1973 und 25.X.1975, 7 Ex. unter Ahornrinde [HINTERSEHER 1979]. **Wt**: Falschmeldung [HORION 1961].

Coryphium gredleri KR., 1870

By: Falschmeldung [HORION 1963].

Boreaphilus velox HEER, 1838

By: Falschmeldung [HORION 1963].

Ochtheophilus flexuosus (FAIRM.LAB., 1854)

Pf+: Ludwigswinkel, Saarbachtal, KÖHLER, 20.VI.1998, 1 Ex. im Autokescher [coll. KÖHLER].

Carpelimus fuliginosus (GRAV., 1802)

Ba+: Bodenseegebiet bei Überlingen, HORION, VI.1944, mehrfach aus Kompost - Karlsruhe, Hardtwald-Fasanengarten, BÜCHE, 7.IV.1987, 1 Ex. gekeschert [HORION 1954b, BÜCHE i.l. 1999].

Carpelimus subtilicornis (ROUB., 1946)

Pf+: Fischbach, Staatsforst, KÖHLER, 21.VI.1998, 1 Ex. im Autokescher [coll. KÖHLER].

Carpelimus ganglbaueri (BERNH., 1901)

Th+: Herbsleben, Sandgrube, VORST, 18.V.1997, 4 Ex. [CUPPEN et al. 1998].

Carpelimus despectus (BAUDI, 1869)

St+: Beendorf, Salzstelle, BÜCHE, 1.VII.1996, 1 Ex. aus einer vegetationsarmen Lehmböschung gestochen [BÜCHE i.l. 1999].

Thinodromus distinctus (FAIRM.LAB., 1854)

Wt?: Stuttgart, v.d. TRAPPEN, XII.1919, 1 Ex. aus Neckargenist, ob autochthon? [HORION 1961b].

Oxytelus sculptus GRAV., 1806

Pf+(-): Ludwigswinkel, Saarbachtal, KÖHLER, 20.VI.1998, 2 Ex. im Autokescher [KÖHLER i.l. 1998].

Oxytelus migrator FAUV., 1904

Hs+: Hanau-Steinheim, DEHNERT, 16.X.1986, 1 Ex. (coll. HÖHNER) [HÖHNER i.l. 1998].

Anotylus pumilus (ER., 1839)

Wt+: Tübingen, Spitzberg, MEYER, VIII.1952-54, 1 Ex. in halbvertrocknetem Schafskot [MEYER 1966].

Anotylus hamatus (FAIRM.LAB., 1856)

Ba-: Unterhildingen/Bodensee, HORION, VIII.1943, 2 Ex. aus Boden unter verrottetem Menschenkot [HORION 1954b].

Platystethus degener MULS.REY, 1879

Ba+: Grissheim, Rheinufer, BÜCHE, 9.V.1997, 2 Ex. unter vertrockneten Algenwatten [BÜCHE i.l. 1999].

Platystethus nodifrons MANNH., 1831

Hn(-): Fehldetermination (ASSING kor.) alter Status bleibt erhalten [STIPPICH & KROOSS 1998].

Bledius longulus ER., 1839

St+(-): Walbeck, Kalksteinbruch, BÜCHE, 24.VII.1996, 1 Ex. [BÜCHE i.l. 1999].

Bledius femoralis (GYLL., 1827)

10

Wt-: Heilbronn, SCRIBA, um 1900, 2 Ex. in coll. FREY [HORION 1961b].

Bledius baudii FAUV., 1870

MV+: Duvennest, ZIEGLER, 8.VIII.1996 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Thinobius praetor SMET., 1959

Ba+: Herten bei Weil a.Rh., SCHILLER, 4.IX.1977, 12 Ex. am Ufer eines austrocknenden Tümpels [SCHILLER 1979b, SCHÜLKE 1998a].

St-: Aken, Elbe, HAHN, VIII.1905, 1 Ex. im Mus. Berlin (MNHUB) [SCHÜLKE 1998a].

Thinobius atomus AUCT.NEC FAUV., 1869

Br/(-): ohne genitaliter überprüfte Belege zu verwerfen [SCHÜLKE 1998a]. **Sn/(-):** ohne genitaliter überprüfte Belege zu verwerfen [SCHÜLKE 1998a].

Thinobius gilvus FAUVEL, 1899

St?: Bad Kösen, 2 Ex. im Mus. Berlin (MNHUB), Vorkommen aber fraglich [SCHÜLKE 1998a].

Oxyporus maxillosus F., 1792

Pf+(-): Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 15.V.1998, 3 Ex. an Blätterpilzen auf Totholz [KÖHLER Mummelskopf].

Stenus gracilipes KR., 1857

Ba-: Kandern, Wolfsschlucht, HARTMANN, 1.V.1920, 1 Ex. [HARTMANN 1926].

Stenus palposus ZETT., 1838

Wt-: Rottweil, 1880, 4 Ex. in coll. PIESBERGEN [HORION 1961b].

Stenus incanus ER., 1839

Ba+(-): Überlingen, Bodenseeufer, HORION, VI.1946 und V.1952, mehrere Ex. [HORION 1963].

Stenus opticus GRAV., 1806

Ba-(-): mehrere Funde [HORION 1963].

Stenus niveus FAUV., 1865

Hs+: Herbstein, HÖHNER, 30.V.1998, 1 Ex. an Sauergräsern [HÖHNER i.l. 1998].

Stenus glacialis HEER, 1839

Wt+: Isny, Schwarzer Grat, DOLDERER, VI.1958 [HORION 1961b].

Stenus montivagus HEER, 1839

Sd+: Saarhölzbach, Nähe Steinbruch, LILLIG, 25.VI.1998, 1 Ex. (t. EISINGER) [coll. LILLIG, EISINGER i.l. 1999].

Dianous coerulescens (GYLL., 1810)

Pf+: Ludwigswinkel, Mummelseeabfluß, KÖHLER, 17.V.1998, 5 Ex. [coll. KÖHLER].

Edaphus beszedesi RTT., 1913

Hs+: Hanau, DEHNERT, 17.X.1970, 4 Ex. (coll. HÖHNER) [HÖHNER i.l. 1998].

Euaesthetus bipunctatus (LJUNGH, 1804)

St+(-): Kümmeritz, LAU LSA, 1997, 1 Ex. (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i.l. 1999].

Paederus caligatus ER., 1840

Ba-: zahlreiche Funde [HORION 1965].

Astenus longelytratus PALM, 1936

Ba+: Rheintrockenaue, viele Fundorte, mehrere Finder [NEUMANN i.l. 1999].

Rugilus angustatus (FOURCR., 1785)

MV+(-): Duvennest, ZIEGLER, 29.VI.1992 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Medon castaneus (GRAV., 1802)

Ba+: Wasenweiler nw. Freiburg, MAUS, 2.I.1997, 4 Ex. aus *Talpa*-Nest [unpubl.].

Medon castaneus (GRAV., 1802)

Wt+: Kornwestheim, KÖSTLIN, III.1958, 1 Ex. in einem Maulwurfsnest [HORION 1961b].

Medon picetus (KR., 1858)

MV+: Testorfer Holz, Zarentin, ZIEGLER, 27.VII.1995 im Autoke-

scher [ZIEGLER i.l. 1999]. **Rh+:** Wiltingen, Galgenberg, Weinbergslagen, KÖHLER 7.VI.1996, 2 Ex. [KÖHLER 1996g].

Medon fuscus (MANNH., 1830)

Sd+: Saarbrücken, Trarbacher Platz, EISINGER, 12.V.1998 und 29.VIII.1998, 2 Ex. (KÖHLER det.) am Kompost angefliegen [coll. EISINGER].

Medon rufiventris (NORDM., 1836)

St+(-): Dessau-Törten, Mulde-Auwald, WRASE, 20.IV.1996, 1 Ex. [SCHÜLKE 1998b].

Medon apicalis (KR., 1857)

MV+: Testorfer Holz, Zarentin, ZIEGLER, 27.VII.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Sunius propinquus (BRIS., 1867)

Ba-: mehrere Fundorte [HORION 1965].

Pseudomedon obscurellus (ER., 1840)

MV+: Testorfer Holz, Zarentin, ZIEGLER, 28.V.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Scopaeus sulcicollis (STEPH., 1833)

MV+: Testorfer Holz, Zarentin, ZIEGLER, 28.V.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Scopaeus pusillus KIESW., 1843

Ba+: Grissheim, Rheintrockenaue, NEUMANN, 22.III.1997, zahlreich gerne in der Nähe von *Formica*-Nestern und BÜCHE, 15.V.1997, 1 Ex. auf einem Kiestrockenrasen [NEUMANN i.l. 1999, BÜCHE i.l. 1999].

Scopaeus ryei WOLL., 1872

St+: Aseleben, Salziger See, SCHÜLKE, 30.V.1998, aus dichtem Binsenbestand geklopft [SCHÜLKE 1998c].

Scopaeus gracilis (SPERK, 1835)

Pf+(-): Ludwigswinkel, Saarbachtal, KÖHLER, 14.V.1998, 1 Ex. im Autokescher [coll. KÖHLER].

Lathrobium bicolor ER., 1840

Ba+(-): Grissheim, Rheintrockenaue, SZALLIES, 2.VII.1997, 1 Ex. an einem Kiesgrubenufer [NEUMANN i.l. 1999].

Lathrobium angustatum BOISD.LAC., 1835

Ba+: Belchen, 1000m, SCHILLER, 14.VI.1979, 1 Ex. [SCHILLER 1989].

Lathrobium sphagnetorum MUONA, 1977

Ba-: Binningen/Hegau, HARTMANN, 12.VI.1924, 1 Ex. aus feuchtem Genist gesiebt [HARTMANN 1926].

Lathrobium dilutum ER., 1839

Hs+(-): Langgöns, STORCK, 18.VII.1989, 1 Ex. in einer Köderdose (coll. HÖHNER) [HÖHNER i.l. 1998].

Achenium depressum (GRAV., 1802)

Ba-: Achdorf, Wutachschlucht, HARTMANN, 8.-19.VI.1908, 1 Ex. [HARTMANN 1911].

Cryptobium collare RTT., 1884

Ba+: Grissheim, Rheintrockenaue, SZALLIES, 16.VII.1995, 1 Ex. (t. KASPER) [NEUMANN i.l. 1999]. **St+:** Aseleben, Salziger See, SCHÜLKE, 30.V.1998, aus dichtem Binsenbestand geklopft [SCHÜLKE 1998c].

Metoponcus brevicornis (ER., 1839)

Wt+: Wangen, Argental bei Blumegg, BENSE, 25.VI.1997, 1 Ex., an einem Nadelholzstamm [BENSE i.l. 1999].

Xantholinus glabratus (GRAV., 1802)

Ba+: Überlingen, HORION, ohne Datum, mehrfach aus Kompost [HORION 1961b].

Xantholinus semirufus (RTT.) STEEL, 1950

Ba+: Lörrach, BREDDIN, VIII.1935, 1 Ex. - Stühlingen, Wutachgebiet, HORION, V.1955, 1 Ex. - Sandhausen, Dünengebiet, BÜCHE, zahlreich in Bodenfallen - Grissheim, Rheintrockenaue, NEUMANN, 7.VI.1991, zahlreich (t. BÜCHE) [HORION 1965, BÜCHE 1994, NEUMANN i.l. 99].

Atrecus longiceps (FAUV., 1872)

Ba+(-): Belchen, BAUM, 1.X.1980 & 6.VIII.82, 2 Ex. (SCHILLER det.) [SCHILLER 1989].

Othius lapidicola MAERK.KIESW., 1848

- Wt+**: Hinterrötenberg bei Freudenstadt, KÖSTLIN, IV.1957, 1 Ex. [HORION 1961b].
Erichsonius subopacus (HOCHH., 1851)
- Hs-**: Bad Nauheim, Höchst, ohne Datum [UHLIG & STERRENBURG 1990].
Hesperus rufipennis (GRAV., 1802)
- Sd+**: Saarbrücken, Waldschutzgebiet Steinbachtal, MÖLLER, Funddaten unbekannt [coll. MÖLLER, EISINGER i.l. 1999].
Philonthus ebeninus (GRAV., 1802)
- Hn(-)**: Fehldetermination (ASSING korrt.), alter Status bleibt erhalten [STIPPICH & KROOSS 1998].
Philonthus nigriventris THOMS., 1867
- Rh+**: Welschneudorf, NWZ Stelzenbach, KÖHLER, 4.VI.1998, 3 Ex. an ausgelegtem Taubenmist [KÖHLER Stelzenbach].
Philonthus rufimanus Er., 1840
- Wt**: Stuttgart, vor 1900, 1 Ex. in coll. SCHILSKY - Ulm, vor 1900, 1 Ex. in coll. BOSCH [HORION 1961b].
Philonthus micantoides BEN.LOHSE, 1956
- Hn**: Fehldetermination (ASSING korrt.) [STIPPICH & KROOSS 1998].
Rh+: Spay, Rheinbogen, KÖHLER, 6.VI.1998, 1 Ex. im Autokescher [coll. KÖHLER].
Rabigus pullus (NORDM., 1837)
- Ba+(-)**: Istein, Rheinaue, SCHILLER [NEUMANN i.l. 1999]. **Hs+(-)**: Vierheimer Heide, HÖHNER, 23.IX.1995, 6.X.1995 und 24.IX.1998, 4 Ex. auf Binnendünen [HÖHNER i.l. 1998].
Gabronthus thernarum (AUBE, 1850)
- Hs+(-)**: Hanau, Große Bulau, DEHNERT, 6.IX.1969, 1 Ex. (coll. HÖHNER) [HÖHNER i.l. 1998]. **Sd+**: Saarbrücken, Trarbacher Platz, EISINGER, 6.IX.1998, 1 Ex. (KÖHLER det.) aus Grasschnitt gesiebt [coll. EISINGER]. **Wt-**: Eisenbach, v.d. TRAPPEN, IX. vor 1931, 1 Ex. [HORION 1961b].
Gabrius exiguus (NORDM., 1837)
- Ba+**: mehrere Funde [HORION 1965].
Gabrius tirolensis (LUZE, 1903)
- Rh+**: Ahrbrück, Demnbachtal, KÖHLER, 12.V.1998, 2 Ex. im Autokescher [coll. KÖHLER].
Gabrius astutooides (STRAND, 1946)
- Pf+(-)**: Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 14.V.1998, 1 Ex. im Autokescher [KÖHLER Mummelskopf]. **Sd(+)**: die einzige Meldung wurde zurückgezogen [EISINGER i.l. 1999].
Gabrius lividipes (BAUDI, 1848)
- Ba+**: Grissheim, Rheintrockenaue, SZALLIES, 16.V.1997, 1 Ex. im Autokescher [NEUMANN i.l. 1999].
Gabrius suffragani JOY, 1913
- Hn**: Fehldetermination (ASSING korrt.) [STIPPICH & KROOSS 1998].
Creophilus maxillosus (L., 1758)
- Sd+**: Saarbrücken, Talstrasse, EISINGER, 5.V.1992, 1 Ex. Totfund [coll. EISINGER].
Platydracus chalcocephalus (F., 1801)
- Th+(-)**: Bad Frankenhausen, SW-Kyffhäuser, FRISCH, 1994 [SCHAFFRATH i.l. 1999].
Ocyus tenebricosus (GRAV., 1846)
- Pf+(-)**: Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 19.VIII.1998, 5 Ex. unter liegendem Buchenthoholz [KÖHLER Mummelskopf].
Ocyus globulifer (FOURCR., 1785)
- Ba.**: Fahmau bei Schopheim/Wiesetal, HARTMANN, 10.V.1896, in Kuhmist [HARTMANN 1911].
Heterothops quadripunctulus (GRAV., 1806)
- Ba-**: Endingen, Kaiserstuhl, WOLF, 1 Ex. aus Weidenmulm [HORION 1965].
Heterothops minutus WOLL., 1860
- MV+**: Pritzier, ZIEGLER, 4.I.1999 [ZIEGLER i.l. 1999].
Astrapaues ulmi (ROSSI, 1790)
- Ba.**: Karlsruhe, 1 altes Ex. in coll. BOSCH [HORION 1965].
Velleius dilatatus (F., 1787)
- Th+(-)**: Plau, SCHAFFRATH, 1996 [SCHAFFRATH i.l. 1999]. **Wt+**: Tübingen, VIELMETTER, IX.1952, 1 Ex. - Stuttgart, Rosensteinkopf, OSTEN vid., 8.VI.1992, 1 Ex. in einem Homissen-Nestschaukasten [HORION 1961b, OSTEN 1992].
Quedius truncicola FAIRM. & Lab., 1856
- Pf+(-)**: Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 11.X.1998, 1 Ex. in einer Fensterfalle [KÖHLER Mummelskopf].
Quedius brevicornis THOMS., 1860
- Hn+(-)**: Hannover-Eilenriede, Stadtpark, ASSING, 8.V.1998, 1 Ex. in einer hohlen Eiche [coll. ASSING, L. SCHMIDT i.l. 1999].
Quedius ochropterus Er., 1840
- Ba+**: Altsteigerkopf, SZALLIES, 31.VIII.1996, 1 Ex. auf einer Stein-schutthalde [SZALLIES 1998].
Quedius limbatus (HEER, 1834)
- Ba?**: Feldberggebiet, HORION & KARDASCH - Heidelberg, HÜTHER, IX.1935 - Überlingen, Bodensee, HORION, seit 1943 mehrfach - Zastlertal, Prag, MOLENA (Bestimmung fraglich) [HORION 1951b, 1965, MOLENA 1996].
Quedius humeralis STEPH., 1832
- Sd+**: Saarbrücken, Trarbacher Platz, EISINGER, 27.VIII.1998, 1 Ex. (KÖHLER det.) aus Grasschnitt gesiebt [coll. EISINGER].
Quedius alpestris (HEER, 1839)
- Ba+(-)**: Oberried und Todtnau, Zastlertal und Feldberg, VI.-VII.1950-52, mehrfach [HORION 1965].
Quedius auricomus KIESW., 1850
- Hn+**: Umg. Goslar, JUNG, 1984, 1 Ex. [JUNG i.l. 1999].
Quedius semiaeneus (STEPH., 1833)
- Wt+(-)**: Schlattstall bei Nürtingen, KÖSTLIN, IX.1958, 1 Ex. [HORION 1961b].
Quedius semiobscurus (MARSH., 1802)
- Ba+**: mehrere Meldungen [HORION 1965].
Acylophorus wagenschieberi KIESW., 1850
- Ne+**: Brambostel, ZIEGLER u.a., 21.V.1998 [ZIEGLER i.l. 1999].
Acylophorus glaberrimus (HBST., 1784)
- Wt-**: Heidenheim, Hürbeufer, DOLDERER, IV.1948, 1 Ex. aus nassem Moos [HORION 1961b].
Atanygnathus terminalis (Er., 1839)
- No+**: Wesel, Diersfordter Wald, KATSCHAK, 26.VIII.1998, 1 Ex. aus Sphagnum in einem Waldmoor [KATSCHAK mdl. Mitt. 1998].
Trichophya pilicornis (GYLL., 1810)
- MV+**: Testorfer Holz, Zarentin, ZIEGLER, 27.VII.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].
Mycetoporus bauduieri MULS.REY, 1875
- Rh+**: Taben-Rodt/Saar, Urwald von Taben, KÖHLER, 20.IX.1997, 2 Ex. auf einer Blockhalde aus Moospolstern [KÖHLER Taben].
Mycetoporus brucki (PAND., 1869)
- Ba+**: Münstertal, Südschwarzwald, 1020m, LEMPARSKI, III./IV.79, in einer Bodenfalle [SCHILLER 1989].
Bryoporus cernuus (GRAV., 1806)
- Ne+(-)**: Forst Landwehr, Grippel, ZIEGLER, 9.V.1998 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].
Bryopodacis crassicornis (MAEKL., 1847)
- Ba+**: Münstertal, Südschwarzwald, 1020m, LEMPARSKI, VI.79, in einer Bodenfalle [SCHILLER 1989].
Bryopodacis rufus (Er., 1839)
- Ba+(-)**: Hotzenwald, SZALLIES [MERTENS i.l. 1999].
Lordithon pulchellus (MANNH., 1830)
- MV+**: Gothmann, ZIEGLER, 1.VI.1994 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].
Carphacis striatus (OL., 1794)
- Pf+**: Schaidt, NWR Stuttferch, KÖHLER, 31.VIII.1997, 4 Ex. aus

einem frischen Riesenporling an einer Buche [KÖHLER Bienwald].

Bolitobius inclinans (GRAV., 1806)

Pf+: Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 11.X.1998, 1 Ex. aus Blätterpilzen gesiebt [KÖHLER Mummelskopf].

Sepedophilus pedicularius (GRAV., 1802)

Ba+?: Kleinkems, Rheintrockenaue, BÜCHE & ESSER, 3.XI.1997, zahlreich [NEUMANN i.l. 1999].

Tachyporus quadriscopulatus PAND., 1869

Wt+: Türkheim, PFIZER, X.1957, 1 Ex. [HORION 1967].

Lamprinodes saginatus (GRAV., 1806)

Ba-: Überlingen, HORION, III.-IV.1943-45, mehrfach aus trockenen Moosen in lichter Fichtenschonung [HORION 1967].

Lamprinodes haematopterus (KR., 1857)

Ba.: Heidelberg, KRAATZ, 1 Ex. "im Herbst unter Spreu" [HORION 1967].

Lamprinus erythropterus (PANZ., 1796)

Ba+: Grissheim, Rheintrockenaue, SZALLIES, 16.IX.1995 und 14.VII.1996, 3 Ex. [NEUMANN i.l. 1999].

Tachinus proximus KR., 1855

MV+: Röggeleiner Holz, ZIEGLER, 25.VI.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Myllaena dubia (GRAV., 1806)

Sd+: Saarbrücken, Nauwies, EISINGER, 25.I.1997, 1 Ex. aus Laub [coll. EISINGER].

Pronomaea korgei LOHSE, 1974

Ba-: Mannheim, SCHAAF, 27.VII.1908, 1 Ex. (KÖHLER det., coll. Mus. Frankfurt/M.) [KÖHLER 1997d].

Holobus flavicornis (BOISD.LAC., 1835)

MV+: Testorfer Holz, Zarentin, ZIEGLER, 27.VII.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Holobus apicatus (ER., 1837)

Hs+: Traisa, Trautheim, HANSEN, 14.V.1963, 1 Ex. im Autokescher (coll. HÖHNER) [HÖHNER i.l. 1998]. **St+**: Seebenaue Holz, ZIEGLER, 7.VII.1993 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Cypha ovulum (HEER, 1839)

Ba-: Markt, HARTMANN, II.1926, 1 Ex. [HORION 1967].

Cypha seminula (ER., 1839)

Ba?: vier Fundorte in Südbaden um 1910, Belege im Museum Dresden sollten geprüft werden [HARTMANN 1911, NEUMANN i.l. 1999].

Cypha punctum (MOTSCH., 1857)

Pf+: Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, MATERN, 2.VII.1998, 2 Ex. (KÖHLER det.) im Autokescher [KÖHLER Mummelskopf].

Gyrophana rousi DVORAK, 1966

Ba+: Stollhofen, ehemaliger Fliegerhorst, SZALLIES, 29.V.1996, 1 Ex. im Autokescher [SZALLIES 1998].

Gyrophana munsteri STRAND, 1935

Ba?: Zastleral und Feldberg, HORION, wahrscheinlich 1950/52, später (HORION 1967) nicht mehr gemeldet [HORION 1954b]. **Pf+**: Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 15.V.1998, 45 Exemplare an *Pleurotes* sp. [KÖHLER Mummelskopf].

Gyrophana transversalis STRAND, 1939

Hn+: Betheln, Sandgrube, SPRICK, 13 Ex. (ASSING det.) [ASSING 1998b].

Gyrophana joyi WENDELER, 1924

Pf+: Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, MATERN, 2.VII.1998, 2 Ex. (KÖHLER det.) im Autokescher [KÖHLER Mummelskopf].

Gyrophana angustata (STEPH., 1832)

Pf+: Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 15.V.1998, 24 Exemplare an *Pleurotes* sp. [KÖHLER Mummelskopf].

Agaricochara latissima (STEPH., 1832)

Hs+(-): Gettenbach, Gelnhausen, HÖHNER, 21.XII.1993 an *Criolus versicolor*, weitere Funde [HÖHNER i.l. 1998].

Cyphea curtula (ER., 1837)

MV+: Röggeleiner Holz, ZIEGLER, 25.VI.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999]. **Wt+**: mehrere Funde im Raum Ludwigsburg 1987-89 [MALZACHER 1990].

Placusa depressa MAEKL., 1845

Ba+(-): Überlingen, HORION, X.1950, 1 Ex. in Pilz an Fichtenstumpf [HORION 1954b].

Placusa incompleta SJÖB., 1934

No(?): geprüfte Belege gehören zu *Placusa tachyporoides* [KÖHLER 1998e]. **Rh**(?): geprüfte Belege gehören zu *Placusa tachyporoides* [KÖHLER 1998e]. **Sd**(+): sicher Fehlbestimmung [KÖHLER 1998e].

Silusa rubiginosa ER., 1837

Pf+(-): Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 15.V.1998, 1 Ex. in einer Flugfalle [KÖHLER Mummelskopf].

Megaloscapa punctipennis (KR., 1856)

Ba+: Munzingen, Tuniberg, MAUS, 3.IV.1988, 1 Ex. [MAUS i.l. 1999].

Wt+: Tübingen, Spitzberg, MEYER, IV.1952-54, 2 Ex. aus Moos gesiebt [MEYER 1966].

Leptusa norvegica STRAND., 1941

Wt+: Tübingen, Spitzberg, MEYER, XI.1952-54, 1 Ex. unter Fichtenrinde [MEYER 1966].

Euryusa castanoptera KR., 1856

Ba+: Grenzach-Wyhlen, SCHILLER, 26.IV.1977, 1 Ex. unter Rinde einer morschen Buche - Grissheim, Rheintrockenaue, SZALLIS, 10.VI.1997, 1 Ex. (t. KASPER) [SCHILLER 1979, NEUMANN i.l. 1999]. **Ne+**: Radbruch, MEYBOHM, 22.IV.1998 [ZIEGLER i.l. 1999].

Euryusa sinuata ER., 1837

Ba.: Fahrnau b. Schopheim/Wiesetal, HARTMANN, 2.V.1897, unter Eichenrinde bei *Lasius brunneus* [HARTMANN 1911].

Euryusa pipitzi (EPH., 1887)

Pf+: Schaidt, Bienwald, NWR Stuttperch und Mörderhäufel, KÖHLER, 29.VI.1996, je 1 Ex. (ASSING det.) [KÖHLER Bienwald].

Bolitochara mulsanti SHP., 1875

Wt+: Markgröningen, III.1961 - Urach - St. Johann, IX.1961, alle KÖSTLIN leg. [HORION 1967].

Mymeococephalus concinna (ER., 1839)

Rh+: Spay, Rheinbogen, KÖHLER, 6.VI.1998, 1 Ex. im Autokescher [coll. KÖHLER].

Borboropora kraatzii FUSS, 1862

Ba+: Schwarzatalt, SZALLIES, 12.VI.1996, 1 Ex. im Autokescher [SZALLIES 1998].

Gnypteta ripicola (KIESW., 1844)

MV+: Pritzier, ZIEGLER, 4.I.1999 [ZIEGLER i.l. 1999].

Hydrosmeeta septentrionum (BENICK, 1969)

Pf+: Fischbach, Staatsforst, 21.VI.1998, 1 Ex. im Autokescher [coll. KÖHLER].

Disopora ultima (BENICK LOHSE, 1959)

MV+: Bandekow, ZIEGLER, 5.II.1995 [ZIEGLER i.l. 1999].

Aloconota planifrons (WTRH., 1864)

Ba+: Grissheim, Rheintrockenaue, SZALLIES, 7.IV.1996 und 10.VI.1997, 2 Ex. (t. KASPER) [NEUMANN i.l. 1999].

Notothecta confusa (MÄRK., 1844)

Ba+: Weinstetten, Rheinaue, BÜCHE, 2.XI.1997, 1 Ex. an einem Nest von *Lasius fuliginosus* [BÜCHE i.l. 1999].

Neohilara subterranea (MULS.REY, 1853)

Hs+: Rheininsel Kühkopf, VOGT, 29.I.1955 und Schlüchtern, BORNHOLT, 9.VII.1987, je 1 Ex. (coll. HÖHNER) [HÖHNER i.l. 1998].

Dochmonota clancula (ER., 1837)

Pf+: Schaidt, NWR Stuttperch, KÖHLER, 31.VIII.1997, 28 Ex. aus Reisig, Streu und Detritus in einem trockengefallenen Wassergraben [KÖHLER Bienwald].

Taxicera renneri BENICK, 1982

Ba+: Grissheim, Rheintrockenaue, SZALLIES, 9.VII.1997, 1 Ex. (t.

- KASPER) im Autokescher [NEUMANN i.l. 1999].
Dinaraea arcana (ER., 1839)
Ba-: Fahmau bei Schopfheim/Wiesetal, HARTMANN, 5.V.1910 [HARTMANN 1911].
Liogluta pagana (ER., 1839)
Sd+: Saarbrücken, Trarbacher Platz, EISINGER, 25.X.1998, 1 Ex. (KÖHLER det.) aus Kirschbaumlaub gesiebt [coll. EISINGER].
Atheta hygrobia (THOMS., 1856)
Pf+: Schaidt, NWR Stuttferch, KÖHLER, 31.VIII.1997, 7 Ex. aus Detritus in einem trockengefallenen Graben [KÖHLER Bienwald].
Atheta tmolosensis BERNH., 1940
MV+: Röttgeline Holz, ZIEGLER, 25.VI.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].
Atheta volans (SCRIBA, 1859)
Pf+: Schaidt, NWR Mörderhäufel, KÖHLER, 31.VIII.1997, 6 Ex. aus Detritus in einem Entwässerungsgraben [KÖHLER Bienwald].
Atheta debilis (ER., 1837)
MV+: Gothmann, ZIEGLER, 1.VI.1994 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].
Atheta scotica (ELL., 1909)
Ba+: Grissheim, Rheintrockenaue, SZALLIES, 10.VI.1997, 2 Ex. im Autokescher [NEUMANN i.l. 1999].
Atheta soedermani BERNH., 1931
By+: Kallmünz, Raffä-Waldgebiet, RENNER, 30.V.1998, 1 Ex. im Autokescher [RENNER i.l. 1999].
Atheta volitans BENICK, 1970
Ba+(?): Belchen-Gebiet, BAUM & SCHILLER, 1977-82, mehrere Funde [SCHILLER 1989].
Atheta atricolor (SHP., 1869)
Ba+: Belchen-Gebiet, SCHILLER, 1980-82, mehrere Funde [SCHILLER 1989].
Atheta testaceipes (HEER, 1841)
Ba+: Weinstetten, Rheintrockenaue, SZALLIES, 2.VII.1997, 1 Ex. an einem Lamellenpilz - Grissheim, Rheintrockenaue, SZALLIES, 25.V.1995, 1 Ex. im Autokescher [NEUMANN i.l. 1999]. **Hs+**: Schlüchtern, Hohenzell, BORNHOLDT, 17.VI.1987, 3.VII.1987 und 11.VII.1988, 4 Ex. (coll. HÖHNER) [HÖHNER i.l. 1998]. **Wt+**: Tübingen, Spitzberg, MEYER, III. und X.1952, 2 Ex. an Aas [MEYER 1966].
Atheta pervagata BENICK, 1974
Ba+: Jöhlingen, GREILER, VI.90, 2 Ex. (det. coll. BÜCHE) [BÜCHE i.l. 1999].
Atheta viennensis BENICK, 1974
Ba?: Grifflheim, Rheinaue, SZALLIES, 10.VI.1997, 1 Ex. im Autokescher (ungeprüft) [SZALLIES 1998].
Atheta hansseni STRAND, 1943
Ba+: Belchen-Gebiet, SCHILLER, 1977-82, mehrere Funde [SCHILLER 1989].
Atheta subglabra (SHP., 1869)
Hs+(-): Rudingshain, NWR Niddahänge, FLECHTNER, 1990-92 [FLECHTNER et al. 1993].
Atheta fussi BERNH., 1908
Ba?: Grifflheim, Rheinaue, SZALLIES, 9.VII.1997, 1 Ex. im Autokescher (ungeprüft) [SZALLIES 1998].
Atheta orbata (ER., 1837)
Hn+: NSG Lüneburger Heide, Tütsberg, MELBER, 1997, mehrfach (ASSING det.) in Bodenfallen [coll. ASSING, L. SCHMIDT i.l. 1999].
Atheta orphanata (ER., 1837)
Sd+: Saarbrücken, Saarkohlenwald, MÖLLER, VIII.1998, 1 Ex. im Autokescher [MÖLLER i.l. 1999].
Atheta amblystegii BRUNDIN, 1952
Ba?: Bestimmung unsicher [GLADITSCH 1978].
Atheta subsinuatata (ER., 1839)
Ba-: Fahmau bei Schopfheim/Wiesetal, HARTMANN, ohne nähere Angaben [HARTMANN 1911].
Atheta zosteriae (THOMS., 1856)
Hs+(-): Heussenstamm, FLECHTNER, 16.VIII.1998, mehrfach im Ufersand einer aufgelassenen Sandgrube [FLECHTNER i.l. 1999].
Atheta sordidula (ER., 1837)
Pf+(-): Schaidt, NWR Stuttferch, KÖHLER, 27.V.1997, 30 Ex. aus ausgelegtem Taubenmist [KÖHLER Bienwald].
Atheta laevicauda SAHLB., 1876
Hs+: Rudingshain, NWR Niddahänge, FLECHTNER, 1990-92 [FLECHTNER et al. 1995].
Atheta xanthopus (THOMS., 1856)
Ba+: Grissheim, Rheintrockenaue, SZALLIES, 6.IV.1996 und 9.VII.1997, je 1 [NEUMANN i.l. 1999].
Atheta fimorum (BRIS., 1860)
Wt+: Gammertingen, HEMMANN, VI.1975, 1 Ex. (ÜLBRICH det.) [HEMMANN 1979].
Atheta intermedia (THOMS., 1852)
Hs+: Rudingshain, NWR Niddahänge, FLECHTNER, 1990-92 [FLECHTNER et al. 1993].
Atheta leonhardi BERNH., 1911
Ba+: Todtnauberg, BENICK - Belchen, 1200m, BAUM, 26.VII.1981, 1 Ex. - Zastlertal, MOLENDEN [HORION 1951b, SCHILLER 1989, MOLENDEN 1996].
Acrotoma pseudotenera (CAM., 1933)
Wf+: Werther-Isingdorf, Teutoburger Wald, RENNER, 23.IV.1998, 1 Ex. im Autokescher [RENNER i.l. 1999].
Acrotoma parvula (MANNH., 1831)
Hs+(-): Neuhof, NWR Schönbusche, FLECHTNER, 1990-92 [DOROW et al. im Druck].
Aleuonota rufotestacea (KR., 1856)
Ba+: Grissheim, Rheintrockenaue, LAU, 9.IV.1995, 1 Ex. (t. KASPER) - Kändern, Wolfsschlucht, HARTMANN, 1.V.1920 [NEUMANN i.l. 1999, HARTMANN 1926].
Zyras laticollis (MARK., 1844)
Hs+(-): Dietsheim, 28.VIII.1984, Enkheimer Ried 11.XII.1984 und Hanau, 17.V.1984, jew. SCHROTH leg. (COLL.HÖHNER) [HÖHNER i.l. 1998].
Ilyobates nigricollis (PAYK., 1800)
Th+(-): Ichstedt, SW-Kyffhäuser, FRISCH, 1994 [SCHAFFRATH i.l. 1999].
Calodera nigrita MANNH., 1830
MV+: Röttgeline Holz, ZIEGLER, 25.VI.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].
Calodera uliginosa ER., 1837
Ba-: Achkarren, Faule Waag, WOLF, III.1936 [HORION 1967].
Ityocara rubens (ER., 1837)
MV+: Testorfer Holz, Zarentin, ZIEGLER, 26.VI.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].
Amarochara forticornis (BOISD.LAC., 1835)
Ba+: Grenzach-Wyhlen, SCHILLER, 23.IV.1977, gestreift [SCHILLER 1979b].
Meotica winkleri BENICK, 1954
SH+ (?): St.Peter-Ording, ZIEGLER, 17.V.1980, Bestimmung ist nach LOHSE sicher [ZIEGLER i.l. 1999].
Ocyusa maura (ER., 1837)
Pf+: Schaidt, NWR Stuttferch, KÖHLER, 31.VIII.1997, 18 Ex. aus Detritus in einem trockengefallenen Graben [KÖHLER Bienwald].
Zoosetha procioua (ER., 1837)
MV.: Fürstenberg, KONOW, 1880-87, mehrfach [ASSING 1998a].
Zoosetha inconspicua (ER., 1839)
SH+: Hohwacher Bucht, KNAPPE, 8.IV.1962, 1 Ex. [ASSING 1998a].
Hygropora cunctans (ER., 1837)
MV+(-): Gülze, ZIEGLER, 12.III.1999 [ZIEGLER i.l. 1999].

Oxygoda lugubris KR., 1856

Ba+: Zastlertal, KARDASCVH, mehrfach. - Belchen-Nordhang, 1250m, BAUM, 5.IX.1981, 1 Ex. [HORION 1954, SCHILLER 1989].

Oxygoda skalitzkyi BERNH., 1902

Hs+: Rudingshain, NWR Niddahänge, FLECHTNER, 1992-93 - Vogelsberg, FOLWACZNY, X.62, 2 Ex. [FLECHTNER et al. 1993, HORION 1967].

Oxygoda vicina KR., 1856

Hs+(-): Frankfurt-Schwanheim, 12.X.1985, 1 Ex. und Viernheimer Heide, HÖHNER, 23.IX.1995, 2 Ex. auf Binnendüne [HÖHNER i.l. 1998].

Oxygoda mutata SHARP, 1871

Ba+(-): Grissheim, Rheintrockenaue, SZALLIES, 10.VI.1997, 1 Ex. (t. KASPER) [NEUMANN i.l. 1999].

Oxygoda flavicornis KR., 1856

Pf+: Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 11.X.1998, 4 Ex. aus Pilzen und Bodenstreu gesiebt [KÖHLER Mummelskopf].

Thiasophila inquilina (MÄRK., 1842)

Ba-: Überlingen, HORION, VIII.1944, 1 Ex. schwärmend [HORION 1954b]. **Hs+**(-): Frankfurt, Seckbacher Ried, 14.VI.1985 und Lämmer-spiel, 9.VII.1983, jew. SCHROTH, 1 Ex. (coll. HÖHNER) [HÖHNER i.l. 1998].

Haploglossa gentilis (MÄRK., 1844)

SH+(-): Fitzen, ZIEGLER, 22.IV.1996 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Haploglossa nidicola (FAIRM., 1852)

Rh+(-): Wiltingen, Galgenberg, Weinbergslagen, KÖHLER 7.VI.1996, 1 Ex. [KÖHLER 1998g].

Haploglossa marginalis (GRAV., 1806)

Pf+(-): Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 22.VII.1998, 5 Ex. in einer Flugfalle mit Taubenmistköder [KÖHLER Mummelskopf].

Aleochara lata GRAV., 1802

By+(-): Würzburg und Sommerhausen, IV/V., ab 1961, mehrfach an Aasköder [PESCHKE & FULDNER 1977].

Aleochara laticornis KR., 1856

Ba?(-): Kaiserstuhlgebiet, WOLF leg. (HORION 1967) ist Fehl-det. (t. MAUS), Heidelberg, HÜTHER, 1930 (l.c.) ? [MAUS i.l. 1998].

Aleochara spissicornis ER., 1839

Wf+: Ossendorf, Heinberg, RENNER, 1.X.1981, 1 Ex. in Bodenfallen [RENNER mdl. Mitt. 1998].

Aleochara stichai LIKOVSKY, 1965

Sd+: Saarbrücken, WaldSG Steinbachtal, MÖLLER, Fundumstände unbekannt [coll. MÖLLER, EISINGER i.l. 1999].

Aleochara laevigata GYLL., 1810

Hs+(-): Hanau, Kleine Bulau, HÖHNER, 22.IV.1987, 2 Ex. Hasenkada-ver [HÖHNER i.l. 1998].

Aleochara haemoptera KR., 1856

Ba+: Istein, Neuenburg, Grissheim, mehrere Finder, VIII.98, zahlreich (t. MAUS) [NEUMANN i.l. 1999].

Aleochara cuniculorum KR., 1858

MV+(-): Drönnewitzer Holz, ZIEGLER, 24.IV.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Aleochara major FAIRM., 1857

St+: Athenstedt, LAU LSA, 1997, zahlreich (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i.l. 1999].

Aleochara binotata KR., 1856

Sd-: Saarbrücken, LASS, V.1941, 1 Ex. (coll. Mus. Berlin) [MAUS 1996].

Aleochara verna SAY, 1836

Br-: Berlin, KRAATZ (MAUS det., coll. Mus. Berlin) [MAUS 1998a].

Th+: Meuselbach-Schwarzzmühle, UHLIG, VIII.1973, 1 Ex. (MAUS det., coll. Mus. Berlin) [MAUS 1998a].

Familie PSELAPHIDAE

Bibloporus ultimus GUILLB., 1892

Pf+(-): Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, IV.-VII.98, mehrfach aus Laubholzmulm gesiebt [KÖHLER Mummelskopf].

Bibloporus minutus RAFFR., 1914

By+: Falkenstein, Frankenberg, RENNER, 6.VI.1998, 1 Ex. im Autokescher [RENNER i.l. 1999].

Bibloporus mayeti GUILLB., 1888

Sn+: Thallwitz, Oberlauch, BENSE, 23.VII.1997, 1 Ex., am Leimring [BENSE i.l. 1999].

Biblepsectus pusillus (DENNY, 1825)

Pf+(-): Schaidt, NWR Mörderhäufel, KÖHLER, 28.IX.1997, 4 Ex. aus einem vertrockneten Schwefelporling an Eiche [KÖHLER Bienwald].

Euplectus decipiens RAFFR., 1910

Ba+: Ruhenstein, Bannwald Wilder See, BENSE, 24.VII.1995, 1 Ex [BENSE i.l. 1999].

Euplectus sparsus BES., 1964

Rh+: Welschneudorf, NWZ Stelzenbach, KÖHLER, 20.VII.19 im Autokescher und 8.VIII.1998, 5 Ex. in Fensterfallen [KÖHLER Stelzenbach].

Euplectus infirmus RAFFR., 1910

Ba+: Grissheim, Rheintrockenaue, SZALLIES, 14.VII.1996, 3 Ex. am Fuss einer morschen Eiche, später auch mehrfach im Autokescher [NEUMANN i.l. 1999].

Euplectus bonvouloiri RITT., 1881

Ba+: Grissheim, Rheintrockenaue, SZALLIES, 9.VII.1997, 1 Ex. im Autokescher [NEUMANN i.l. 1999]. **Br+**: Eisenhüttenstadt, Oderaue, PÜTZ, 24.XII.1983, 2 Ex. aus einer alten Feldulme gesiebt [PÜTZ 1989a].

Euplectus duponti AUBÉ, 1833

Rh+(-): Mandern/Hunsrück, Himbeerberg, KÖHLER, 23.VIII.1997, 1 Ex. in einem Buchenwald in einer Fensterfalle [KÖHLER 1998].

Leptoplectus spinolae (AUBÉ, 1844)

Ba+: Freiburg-Opfingen, Mooswald, NEUMANN, 9.V.1997, 1 Ex. bei *Lasius brunneus* in rotmorscher Eiche [NEUMANN i.l. 1999]. **Hs+**: Rudingshain, NWR Niddahänge, FLECHTNER, 1990-92 [FLECHTNER et al. 1993]. **Wf+**: Altenbeken, NWR Ochsenberg, KÖHLER, 30.VI.1998, 1 Ex. in einer Fensterfalle [KÖHLER Ochsenberg].

Plectophloeus nubigena (RITT., 1876)

Wf+: Altenbeken, NWR Ochsenberg, KÖHLER, 30.VI.1998, 1 Ex. unter Buchenrinde [KÖHLER Ochsenberg].

Plectophloeus nitidus (FAIRM., 1857)

Ba+: Grissheim, Rheintrockenaue, SZALLIES, 27.VI.1995, 1 Ex. unter Eschenrinde [NEUMANN i.l. 1999].

Saulcyella schmidtii (MÄRK., 1844)

Br+(-): Schlepzig, Unterspreewald, BENSE, 1998, mehrfach in Gesieben, am Leimring [BENSE i.l. 1999].

Trimium brevicorne (REICHB., 1816)

MV+(-): Testorfer Holz, Zarentin, ZIEGLER, 28.V.1994 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999]. **Ne+**(-): Amt Neuhaus, Forst Karrenzien, ZIEGLER, 1.V.1998 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Trichonyx sulcicollis (REICHB., 1816)

Pf+(-): Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 20.VI.1998, 2 Ex. im Autokescher [KÖHLER Mummelskopf]. **Wt+**: Ulm, PFIZER, V.1962, 4 Ex. aus Pappelmulm [HARDE & KÖSTLIN 1965].

Batrisodes buqueti (AUBE, 1833)

Wt+: Stuttgart, Villa Berg, 12.III.1979 - Stuttgart, Schloßpark, 16.II.1982, 1.III.1982, 13.V.1985 - Stuttgart, Solitude, 14.V.1982, omnia REIBNITZ leg., BESUCHET det. [REIBNITZ i.l. 1999].

Batrisodes unisexualis BES., 1988

Wt+: Stuttgart-Sillenbuch, REIBNITZ, 10.III.1984, BESUCHET det. [REIBNITZ i.l. 1999].

Tychobythinus glabratus (RYE, 1870)

Ba+: Grissheim, Rheinufer, SCHILLER, 29.VI.1982, 1 Ex. [NEUMANN i.l. 1999].

Bryaxis nodicornis (AUBE, 1833)

Ba-: Fahmau bei Schopfheim/Wiesetal, HARTMANN, 1.IV.1894 und 12.VII.1908, ohne Belege [HARTMANN 1926]. **Hs+(-)**: Gelnhausen, Gettenbach, DEHNERT, 1.V.1975 und 20.IX.1975, 4 Ex. (coll. HÖHNER) [HÖHNER i.l. 1998]. **St+**: Benzingerode/Harz, LAU LSA, 1997, 1 Ex. (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i.l. 1999].

Bryaxis nigripennis (AUBE, 1844)

Ba-: Fahmau bei Schopfheim/Wiesetal, HARTMANN 19.V.1912 - Bellingen, HARTMANN, 22.VI.1921 [HARTMANN 1926].

Bryaxis bulbifer (REICHB., 1816)

St+: Jederitz, LAU LSA, 1997/98, 8 Ex. (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i.l. 1999].

Tychus niger (PAYK., 1800)

MV+(-): Duvenest, ZIEGLER, 8.VIII.1996 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Tychus monilicornis RTT., 1880

Ne+: Forst Göhrde, ZIEGLER, 30.VII.1980, 1 Weibchen (normandf?), im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Brachygluta lefebvrei (AUBE, 1833)

Ba-: Fahmau bei Schopfheim/Wiesetal, HARTMANN, 6.IV.1926, 1 Ex. angefliegen [HARTMANN 1926].

Brachygluta xanthoptera (REICHB., 1816)

Ba+(-): Geisingen, Unterhölzer Wald, FRANK, V-VI.1992 [KLESS 1998].

Claviger testaceus PREYSSL., 1790

Hs+(-): Roßdorf, Roßberg, 1.X.1988, 2 Ex. und Steinau, HÖHNER, 4.VI.1972, 1 Ex. [HÖHNER i.l. 1998].

Familie OMALISIDAE

Omalisus fontisbellaquaei FOURCR., 1785

St+(-): Weischütz/Unstrut, LAU LSA, 1996, 1 Ex. (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i.l. 1999].

Familie CANTHARIDAE

Metacantharis discoidea (AHR., 1812)

Hs+: Hanau, L. NEUMANN (coll. HÖHNER) und Hünfeld, HÖHNER, 6.VI.1998, 1 Ex. [HÖHNER i.l. 1998].

Metacantharis clypeata (ILL., 1798)

Hs+: Hanau, L. NEUMANN (coll. HÖHNER) [HÖHNER i.l. 1998].

Absidia rufotestacea (LETZN., 1845)

Pf+: Schaidt, NWR Mörderhäufel, KÖHLER, 28.VII.1997, 1 Ex. an einem Leimring an einer toten Hainbuche [KÖHLER Bienwald].

Rhagonycha gallica PIC, 1923

MV+: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 28.V.1994 [ZIEGLER i.l. 1999].

Silis nitidula (F., 1792)

Ba-: Ottenhöfen bei Bühl, OCHS 1920 (coll. Mus. Frankfurt) [HORION 1953].

Malthinus facialis THOMS., 1864

No+(-): Schleiden-Gemünd, NWR Wiegelskammer, KÖHLER, 28.VI.1992, 2 Ex. in einem Buchenwald aus der Strauchschicht geklopft [KÖHLER 1996a].

Malthinus bilineatus KIESW., 1852

Ba+: Grenzach-Wyhlen, SCHILLER, 3.VIII.1977, 1 Ex. [SCHILLER 1979b].

Malthodes caudatus WEISE, 1892

Wf+: Altenbeken, NWR Ochsenberg, KÖHLER, 30.V.1998, 1 Ex. an einer toten Fichte an einem Leimring [KÖHLER Ochsenberg].

Malthodes misellus KIESW., 1852

Ne+: Wichtenbeck, ZIEGLER u.a., 21.V.1998 [ZIEGLER i.l. 1999].

Malthodes alpicola KIESW., 1852

Br+: Schlepzig, Unterspreewald, BENSE, Mitte V.1998, 1 Ex., Zucht aus Eichenästen [BENSE i.l. 1999].

Malthodes pumilus (BREB., 1835)

Hs+: Rudingshain, NWR Niddahänge, FLECHTNER, 1990-92 [FLECHTNER et al. 1993].

Malthodes crassicornis (MÄCKL., 1846)

Br+: Schlepzig, Unterspreewald, BENSE, 9.V.1998, 1 Ex., an Leimring [BENSE i.l. 1999].

Familie MALACHIIDAE

Charopus concolor (F., 1801)

MV+: Rüterberg, Elbe, ZIEGLER, 4.VII.1995 [ZIEGLER i.l. 1999].

Clanoptilus strangulatus (AB., 1885)

MV+: Rüterberg, Elbe, ZIEGLER, 20.VI.1994 [ZIEGLER i.l. 1999].

Axinotarsus marginalis (CAST., 1840)

Br+(-): Schlepzig, Unterspreewald, BENSE, 1998, mehrfach [BENSE i.l. 1999].

Familie MELYRIDAE

Aplocnemus tarsalis (SAHLB., 1822)

Wt-: Beuron, ZUR STRASSEN, 1949 - Isny, Schwarzer Grat, DOLDERER, 1931 [HORION 1953].

Dasytes fuscus (ILL., 1801)

Ne+(-): Amt Neuhaus, Forst Karrenzien, ZIEGLER, 25.V.1997 [ZIEGLER i.l. 1999].

Familie CLERIDAE

Denops albofasciatus (CHARP., 1825)

Ba+: Grissheim, Rheintrockenaue, LAU, 1994, 1 Ex. aus Eichenästen mit Befall von *Coroebus florentinus* und *Agrilus graminis* gezogen [NEUMANN i.l. 1999].

Allonyx quadrimaculatus (SCHALL., 1783)

Wt+: Rottenburg-Kiebingen, BRITZ, 9.VI.1989, 1 Ex., an Holzklafter anliegend [BRITZ 1990].

Familie DERODONTIDAE

Derodontus macularis (FUSS, 1850)

Ba+: Wutachschlucht [ROPPEL 1990].

Laricobius erichsonii ROSH., 1846

MV+: Gothmann, ZIEGLER, 18.VIII.1994 [ZIEGLER i.l. 1999].

Familie PELTIDAE

Thymalus limbatus (F., 1787)

Pf+(-): Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 20.VI.1998, 1 Ex. an liegender Kiefer [KÖHLER Mummelskopf]. **Wf.(+)**: Letzter Nachweis: Münster-Wolbeck 1879 [LUCHT 1981b].

Familie ELATERIDAE

Ampedus forticornis SCHWARZ, 1900

Ba+: Tauberbischofsheim-Königheim, WURST, 11.VI.1991, 1 Ex. an einem Trockenhang geklopft [WURST 1993].

Ampedus bouweri SCHIMMEL, 1984

Wt?: Öhringen-Unterheimbach, Bembachtal, WURST, 2.VI.1986 - Tübingen, Spitzberg, WURST, 10.V.1989, Artstatus unsicher [WURST 1993].

Ampedus cardinalis (SCHDTE., 1865)

Th+: Bad Frankenhausen, Koschenberg, SCHAFFRATH, 13.VI.19 und 2.VII.1994 [SCHAFFRATH i.l. 1999].

Ampedus hjorti (RYE, 1905)

Wt+: Vorderbüchelberg, Hoher Stein, WURST, 12.V.1988, 1 Ex. gestreift [WURST 1989].

Ampedus triangulum (DORN, 1925)

16

Br+: Berlin-Treptow, Königsheide, ESSER, 13.II.1997, 1 Ex. (WURST det.) aus einem liegenden rotfaulen Birkenstämmchen [ESSER 1998b].

Drasterius bimaculatus (ROSSI, 1790)

Wt+: Stetten ob Lontal, DOLDERER, 10.V.1942 - Laimnau ("im Bodenseegebiet bei Friedrichshafen-Tettang"), MÜLLER, nach v.d. TRAPPEN [HORION 1953].

Selatosomus cruciatus (L., 1758)

Wt+(-): Ulm, PFIZER, V.1960 und andere Daten, mehrfach in einem Auwald [MAUS i.l. 1999].

Limonicus violaceus (MÜLL., 1821)

St+: Colbitz, Lindenwald, C. BAYER, 10.VI.1998, 1 Ex. [BÜCHE i.l. 1999].

Athous campyloides NEWM., 1833

Ne+(i): Wiederfund 1996 in Hamburg, HENGSMITH [ZIEGLER i.l. 1999].

Dicronychus equisetioides LOHSE, 1976

Hs+: Lampertheim, NOLTE, 30.IV.1995, mehrere Ex. im Sand unter Holzstücken [NOLTE 1995].

Familie EUCNEMIDAE

Hylis foveicollis (THOMS., 1874)

MV+: Röggeleiner Holz, ZIEGLER, 27.VI.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

St+: Seebauerer Holz, ZIEGLER, 3.III.1993 [ZIEGLER i.l. 1999].

Familie BUPRESTIDAE

Acmaeodera degener (SCOP., 1763)

Hs(+): der Angabe im Katalog liegt nur eine pfälzische Quelle zugrunde, die Art ist für Hessen zu streichen [KLINGER i.l. 1999].

Chalcophora mariana (L., 1758)

Wt+: [BRECHTEL & KOSTENBADER i.Dr.].

Poecilota variolosa (PAYK., 1799)

Ba+: Kaiserstuhl, Ihringen, WOLF, 1934, 1 Ex. - Kaiserstuhl, Lilienhof, WOLF [HORION 1955].

Scintillatrix dives GULLB., 1889

Th+: Erlau, Silbachtal, WEIGEL, 5.VI.1996, Puppe [WEIGEL 1997].

Wt+: zahlreiche Fundorte [BRECHTEL & KOSTENBADER i.Dr.].

Scintillatrix rutilans (F., 1777)

Ba+: Wittental, GAUSS, 20.VII.1956, 2 Ex. aus Lindenholz - Freiburg, Günterstal, mehrere Finder, ab 1992 zahlreich [GAUSS 1963, NEUMANN i.l. 1999].

Anthaxia millefolii (F., 1801)

Rh+(-): Dörscheid, Roß-Stein, BRENNER, 8.VII.1997 und 20.VII.1997, 15 Ex., NIEHUIS 10.VIII.1997 und 26.VI.1998, 5 Ex. auf einem felsigen Hang - Kaub, Weinbergslagen, NIEHUIS, 6.VIII.1998, 1 Ex. - Dörscheid, Hartungsberg, NIEHUIS, 10.VIII.1998, 1 Ex. [NIEHUIS & BRENNER 1998].

Anthaxia nigrojubata ROUB., 1913

Hs(+): der Angabe im Katalog liegt nur eine pfälzische Quelle zugrunde, die Art ist für Hessen zu streichen [KLINGER i.l. 1999].

Anthaxia sepulchralis (F., 1801)

Ba+: Mannheim-Gartenstadt, VII.74 [NEUMANN i.l. 1999].

Anthaxia godeti CAST.GORY, 1839

MV+: Klein Schmölen, Dömitz, ZIEGLER, 8.VI.1994 [ZIEGLER i.l. 1999].

Coraeus elatus (F., 1787)

Hs(+): der aktuellen Meldung im Katalog lag eine pfälzische Quelle zugrunde, der Art muß ein neuer Status zugeordnet werden [coll. KLINGER]. **Wt+**: zahlreiche Fundorte 1993-1995 in der Rheinebene [BRECHTEL & KOSTENBADER i.Dr.].

Agrilus guerini LACORD., 1835

Hs(+): der Angabe im Katalog liegt nur eine pfälzische Quelle zugrunde, die Art ist für Hessen zu streichen [KLINGER i.l. 1999].

Agrilus cyanescens (RATZ., 1837)

MV+(-): Stintenburg, Schaalsee, ZIEGLER, 13.VII.1995 [ZIEGLER i.l. 1999].

Agrilus betuleti (RATZ., 1837)

Sd+: Saarbrücken, Stadtwald, EISINGER, 27.VI.1979, 1 Ex. (NIEHUIS det.) [coll. EISINGER].

Agrilus ribesi SCHAEF., 1946

Br+: Berlin-Kreuzberg, Görliitzer Park, ESSER, ohne Datum, zahlreiche Ex. (t. GOTTWALD) auf Johannisbeersträuchern [ESSER 1998b]. **Pf+**: Landau, Umg. Ebenberg, BARTSCH, 30.III.1997 (Larven) [NIEHUIS 1997]. **Rh+**: Bärweiler, NIEHUIS, 12.VII.1977, 2 Ex. an *Ribes alpinum* an einem Xerothermhang [NIEHUIS 1997].

Agrilus cuprescens MENETR., 1832

Hs(+): der Angabe im Katalog liegt nur eine pfälzische Quelle zugrunde, die Art ist für Hessen zu streichen [KLINGER i.l. 1999].

Aphanisticus elongatus VILLA, 1835

Hs+(?): Hanau, Neuberg, HÖHNER, 12.VI.1998 an einem Tümpelufer [HÖHNER i.l. 1998].

Aphanisticus pusillus (OL., 1790)

Hs(+): Rabenau-Geilshausen, A. SCHMIDT, Frühjahr 1998, 3 Ex. in einer Bodenfalle (Hs+ zuvor Falscheintrag) [SCHMIDT mdl. 1998].

Habroloma nana (PAYK., 1799)

Hs+(-): Lorch, Weinbergslagen, HÖHNER, 7.V.1988, 2 Ex. [HÖHNER i.l. 1998].

Familie CLAMBIDAE

Calyptomerus alpestris REDT., 1849

Ba+: Belchen, BAUM, 1250m, IX.?, 1 Ex. aus Buchenmull [BAUM 1989]. **Hs+**: Rudingshain, NWR Niddahänge, FLECHTNER, 1990-92 [FLECHTNER et al. 1995].

Calyptomerus dubius (MARSH., 1802)

Hn+: Göttingen, Wald bei Hagenberg, WILLERS, 9.X.1988, 1 Ex. [coll. WILLERS, L. SCHMIDT i.l. 1999].

Clambus simsoni BLACKBURN, 1902

Ne+: Einemhof, MEYBOHM, 31.VII.1984 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999]. **Wf+**: Bielefeld, Teutoburger Wald, RENNER, 9.V.1998, 1 Ex. im Autokescher [RENNER 1998].

Clambus gibbulus (LEC., 1850)

Ba+: Grissheim, Rheintrockenaue, SZALLIES, 9.VII.1997, 1 Ex. im Autokescher [NEUMANN i.l. 1999].

Clambus pallidulus RITZ., 1911

No+: Köln-Worringen, Worringer Bruch, KÖHLER, 25.IV.1987, 1 Ex. aus Weidenlaub gesiebt - weitere Fundorte [KOCH 1990]. **Rh+**: Kirm-Hochstätten, Naheau, 17.V.1986, 1 Ex. aus altem Hochwassergenist gesiebt - weitere Fundorte [KOCH 1990]. **Sd+**: Saarbrücken, Trarbacher Platz, EISINGER, 29.VIII.1998, 1 Ex. unter Reisighaufen gesiebt [coll. EISINGER].

Clambus minutus (STURM, 1807)

Ne+: Forst Landwehr, Grippel, ZIEGLER, 21.VI.1998 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Familie SCIRTIDAE

Elodes pseudominuta KLAUSN., 1971

Hn+: Braunlage, Wurmberg, L. SCHMIDT, 7.VIII.1998, 1 Ex. (t. KLAUSNITZER) [coll. L. SCHMIDT].

Cyphon ruficeps TOURN., 1868

Hs+: Rudingshain, NWR Niddahänge, FLECHTNER, 1990-92 [FLECHTNER et al. 1995].

Familie DRYOPIIDAE

Dryops viemensis (CAST., 1840)

Ba+(-): Istein, Rheinaue, NEUMANN, VIII.98, zahlreich an den Isteiner Schwellen [NEUMANN i.l. 1999].

Familie ELMIDAE*Elmis latreillei* BEDEL, 1878**Hn+**: [KÖLLNER & HAASE 1997].*Oulimnius troglodytes* (GYLL., 1827)**Br-(+)**: Eintrag falsch datiert [HORION 1955].*Limnius muelleri* (ER., 1847)**By(+)**: BRANDL 1978, HEBAUER vid., Beleg heute nicht überprüfbar und fraglich (vgl. HEBAUER 1994) [HESS i.l. 1998].**Familie HETERO CERIDAE***Heterocerus fuscus* KIESW., 1843**Hn+**: Nienburg, HAHLBOHM, I.VIII.1990, 1 Ex. im Ufersand [coll. HAHLBOHM, L. SCHMIDT i.l. 1999].**Familie LIMNICHIDAE***Pelochares versicolor* (WALTL, 1838)**Hs+**: Heussenstamm, FLECHTNER, 16.VIII.1998, mehrfach im Ufersand einer aufgelassenen Sandgrube [FLECHTNER i.l. 1999].*Limnichus pygmaeus* (STURM, 1807)**MV+(-)**: Gülze, ZIEGLER, 12.III.1999 [ZIEGLER i.l. 1999].**Familie DERMESTIDAE***Dermestes undulatus* BRAHM., 1790**SH+(-)**: Hamburg-Moorfleth, ZIEGLER, 2.VI.1998 [ZIEGLER i.l. 1999].*Attagenus smirnovi* ZHANTIEV, 1973**Nei**: Hamburg, Zoolog.Institut, HERRMANN, 29.VIII.1997 [ZIEGLER i.l. 1999].*Attagenus unicolor* (BRAHM, 1791)**Wf+(-)**: Ennigerloh, RÖWEKAMP, 30.VII.1996, 1 Ex. (t. RENNER) [RÖWEKAMP & RENNER i.l. 1998].*Trogoderma versicolor* (CREUTZ., 1799)**Ba+**: Oberrotweil, Kaiserstuhl, WOLF, VI.60 und 62, mehrere Ex. [WOLF 1963].*Globicornis fasciata* (FAIRM., 1859)**Wt+**: Heilbronn, WURST, V.1989, 1 Ex. [WURST 1990].**Familie BYRRHIDAE***Simplocaria maculosa* ER., 1847**Br(+)**: nur alte Belege im Mus. Berlin [PÜTZ i.l. 1999].*Curimopsis nigrita* (PALM, 1934)**Pf+**: Schaidt, Bienwald, ZWECKER, 17.V.1996, 1 Ex. (t. KÖHLER) [coll. Mus. Karlsruhe]. **St+**: Kümmernitz, LAU LSA, 1996/97, zahlreich [JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i.l. 1999].*Curimopsis paleata* (ER., 1846)**Ba+**: Karlsruhe-Hafen, Rheinaltwasser Schleiert, BÜCHE, 8.VI.1985 und weitere Fundorte [BÜCHE i.l. 1999]. **St+(-)**: Knapendorf, Kalkhydratdeponie, SPRICK, V.96, 27 Ex. und VI.96, 18 Ex. in Bodenfallen [PÜTZ & SPRICK 1996].*Curimopsis austriaca* (FRANZ, 1967)**Ba+**: Grenzach-Wyhlen, SCHMID, 21.V.1970 - Istein, Isteiner Klotz und Kaiserstuhl in coll. WOLF (30er Jahre) [SCHILLER 1979b].**Familie BOTHRIDERIDAE***Anommatus duodecimstriatus***Hs+**: Wetzlar, Naturschutzzentrum-Außengelände, A. SCHMIDT, 1996/97, mehrfach [A. SCHMIDT mdl. 1998]. **Rh+(-)**: Bad Neuenahr, Weinberg Nonnenberg/Görres Linden, SCHEUERN, 20/26.VII.1998, 2 Ex. aus Strohmulch gesiebt [SCHEUERN i.l. 1998].**Familie CERYLONIDAE***Cerylon fagi* BRIS., 1867**Sn+**: Zschepplin, Park, BENSE, 1.VII.1996, 1 Ex., an Leimring [BENSE 1998].*Cerylon impressum* ER., 1845**MV+(-)**: Testorfer Holz, Zarentin, ZIEGLER, 28.V.1995 [ZIEGLER i.l. 1999].*Cerylon impressum* ER., 1845**Sn+**: Weißwasser, LANGE, 6.IV.1991 [REIBNITZ i.l. 1999].*Cerylon deplanatum* GYLL., 1827**Hn+(-)**: Göttingen, Hagenberg, WILLERS, 9.X.1988, 1 Ex. [coll. WILLERS, L. SCHMIDT i.l. 1999].**Familie NITIDULIDAE***Carpophilus marginellus* MOTSCH., 1858**MV+**: Duvennest, ZIEGLER, 29.VI.1992 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].*Carpophilus quadrisignatus* ER., 1843**Ba+**: Grissheim, Rheintrockenaue, NEUMANN, 7.V.1994, zahlreich an einer Wildfütterung, später immer wieder im Gebiet gefunden [NEUMANN i.l. 1999]. **Hsi**: Erlensee, HÖHNER, 29.VIII.1994, 1 Ex. an faulenden Äpfeln [HÖHNER i.l. 1998].*Carpophilus truncatus* MURRAY, 1864**Ba+**: Grissheim, Rheintrockenaue, NEUMANN, 1.I.1993, zahlreich an Wildfütterung, später immer wieder im Gebiet gefunden [NEUMANN i.l. 1999]. **Wf+**: Ahlen, RÖWEKAMP, 12.VI.1996, 1 Ex. (t. RENNER) [RÖWEKAMP & RENNER i.l. 1998].*Carpophilus obsoletus* ER., 1843**Nei**: Hamburg, Freihafen, HERRMANN, 18.VII.1997 [ZIEGLER i.l. 1999].*Pria dulcamarae* (SCOP., 1763)**MV+(-)**: Röggeleiner Holz, ZIEGLER, 25.VI.1995 [ZIEGLER i.l. 1999].*Meligethes caudatus* GUILLEBEAU, 1897**Pf+**: Neulauterberg, Bienwald, BÜCHE 21.VI.1992, einige Ex. auf einer trockenen Rasenfläche in Blüten von *Campanula rapunculoides* [BÜCHE i.l. 1999].*Meligethes corvinus* ER., 1845**Th+(-)**: Burgwenden, Finne, ESSER, 3.V.1997, 1 Ex. von blühender Schlehe geklopft [BÜCHE i.l. 1999].*Meligethes fulvipes* BRIS., 1863**Sd+**: Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i.l. 1999].*Meligethes longulus* SCHILSKY, 1894**Ba+**: Geisingen, Unterhölzer Wald, KASPAR, V-VI.1992 [KLESS 1998].*Meligethes czwalinai* RTT., 1871**Ba+(-)**: Todtnau, Feldberg, HORION & KARDASCH, Ende V. und VIII.50, von verschiedenen Blüten - Geisingen, Unterhölzer Wald, KASPAR, V-VI.1992 [KLESS 1998, HORION 1951].*Meligethes lepidii* MILL., 1852**Ba+**: Rußheim, KONZELMANN, VI.1971 [GLADITSCH 1978].*Meligethes sulcatus* BRIS., 1863**MV+**: Duvennest, ZIEGLER, 18.XII.1990 [ZIEGLER i.l. 1999].*Meligethes ochropus* STURM, 1845**MV+**: Rüterberg, Elbe, ZIEGLER, 31.VIII.1994 [ZIEGLER i.l. 1999].*Meligethes lugubris* STURM, 1845**Sd+**: Saarbrücken, Trarbacher Platz, EISINGER, 4.VII.1998, 2 Ex. von *Thymian* [coll. EISINGER].*Meligethes gagatinus* ER., 1845**Sd+**: Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i.l. 1999].*Meligethes egenus* ER., 1845**Pf+(-)**: Schaidt, NWR Mörderhäufel, KÖHLER, 28.VI.1997, 4 Ex. aus der Vegetation gekeschert [KÖHLER Bienwald].*Meligethes carinulatus* FÖRSTER, 1849**MV+(-)**: Gothmann, ZIEGLER, 6.VI.1994 [ZIEGLER i.l. 1999].*Meligethes brachialis* ER., 1845**St+(-)**: Zielitz, BÜCHE & ESSER, 6.VIII.1998, mehrere Exemplare an *Coronilla varia* [BÜCHE i.l. 1999].

Eपुरaea angustula STURM, 1844

Ba(-): Nord-Schwarzwald, Bannwald Hoher Ochsenkopf, BENSE, IX.95, 1 Ex. und VI.96, 1 Ex. in einer Fensterfalle [BENSE & GEIS 1998].

Eपुरaea boreella (ZETT., 1828)

Ne(-): Nindorf, Forst Garlstorf, ZIEGLER, I.IV.1990 [ZIEGLER i.l. 1999].

Eपुरaea binotata RTT., 1872

Ba+: Nord-Schwarzwald, Bannwälder Wilder See und Hoher Ochsenkopf, BENSE, VII-IX.95, 4 Ex. [BENSE & GEIS 1998].

Eपुरaea muehli RTT., 1908

MV+: Drönnewitzer Holz, ZIEGLER, 20.VII.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999]. **Pf**+: Schaidt, NWR Stuttperch, KÖHLER, 28.VI.1996, 4 Ex. im Autokescher [KÖHLER Bienwald].

Eपुरaea silacea (HBST., 1784)

St(-): Rogätz, Hangwald, BÜCHE, 8.VIII.1998, mehrere z.T. frisch geschlüpfte Ex. in den Poren eines Fruchtkörpers von *Polyporus squamosus* an einer alten Ulme [BÜCHE i.l. 1999].

Eपुरaea rufomarginata (STEPH., 1830)

Ba+: Geisingen, Unterhölzer Wald, LAUSBERGER, V-VI.1992 [KLESS 1998]. **MV**(-): Pritzler, ZIEGLER, 4.I.1999 [ZIEGLER i.l. 1999].

Nitidula bipunctata (L., 1758)

Ba+: Freiburg, WOLF, 1 Ex. ohne Datum - Hugstetten bei Freiburg, WOLF, IX.1933, 1 Ex. [MAUS i.l. 1999].

Nitidula flavomaculata ROSSI, 1790

Ba(-): Belege von WOLF (HORION 1960) gehören zu *Litargus connexus* (MAUS det.) [MAUS i.l. 1999].

Pocadioides wajdelota (WANK., 1869)

Wt+: Schwäbisch Gmünd, RÖBEN, 1951, 1 Ex. [HORION 1960].

Thalycra fervida (OL., 1790)

Ba+: Freiburg, MAUS, 17.VI.1993, 1 Ex. an ausfließendem Baumsaft - Grissheim, Rheintrockenaue, LANGE, 27.VI.1995, 1 Ex. an einem Eichensaftfluß - Ibach, Hotzenwald-Moore, SZALLIES, 12.VIII.1997, 1 Ex. [MAUS, NEUMANN & REIBNITZ i.l. 1999].

Familie KATERETIDAE

Kateretes pedicularius (L., 1758)

MV(-): Gülze, ZIEGLER, 12.III.1999 [ZIEGLER i.l. 1999].

Kateretes pusillus (THUNB., 1794)

MV(-): Gülze, ZIEGLER, 12.III.1999 [ZIEGLER i.l. 1999].

Familie MONOTOMIDAE

Monotoma conicicollis AUBÉ, 1837

MV+: Pritzler, ZIEGLER, 4.I.1999 [ZIEGLER i.l. 1999].

Monotoma angusticollis (GYLL., 1827)

MV+: Pritzler, ZIEGLER, 4.I.1999 [ZIEGLER i.l. 1999].

Monotoma longicollis (GYLL., 1827)

MV+: Testorfer Holz, Zarentin, ZIEGLER, 28.V.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Rhizophagus parallelocollis GYLL., 1827

MV(-): Testorfer Holz, Zarentin, ZIEGLER, 3.V.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Rhizophagus oblongicollis BLATCH, HORNER, 1892

Hn+: Walkenried, NWR Staufenberg, IV.+VI.89, 41 Ex. (LOHSE det.) [WINTER 1991]. **MV**+: Testorfer Holz, Zarentin, ZIEGLER, 28.V.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Cyanostolus aeneus (RICHT., 1820)

Ba+: Grissheim, Rheintrockenaue, SZALLIES, 16.V.1997, 1 Ex. im Autokescher [NEUMANN i.l. 1999]. **MV**+: Testorfer Holz, Zarentin, ZIEGLER, 28.V.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Familie CUCUJIDAE

Cucujus cinnaberinus (SCOP., 1763)

Ba.: Schwarzwald, NÖRDLINGER, 1 Ex. in coll. HEYDEN (DEI), unter Ahornrinde [HORION 1960].

Pediacus dermestoides (F., 1792)

SH+: Lauerholz, SUKAT & ZIEGLER, 12.V.1998 [ZIEGLER i.l. 1999].

Familie SILVANIDAE

Silvanoprus fagi (GUER., 1844)

St+: Seebenauer Holz, ZIEGLER, 7.VII.1993 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999]. **Wf**+: Arnsberg-Voßwinkel, Schloß Höllinghofen, Kleine Schee, ELMER, 20.VII.1998, 1 Ex. am Licht [ELMER mdl. Mitt.].

Familie EROTYLIDAE

Triplax lepida (FALD., 1835)

Hs(-): Groß-Gerau, HÖHNER, 14.V.1977, 4 Ex. an *Polyporus squamosus* und toten Ästen - Bürstadt bei Bensheim, REIBNITZ, 4.VI.1978, unter Buchenrinde - Seligenstädter Stadtwald, REIBNITZ, 30.V.1998, 2 Ex. an *Polyporus* [HÖHNER i.l. 1998, REIBNITZ 1986b, i.l.99]. **St**+: Walbeck, Steinbruch, BÜCHE, 30.VI.1996, 1 totes Ex. von einem Busch geklopft - Athenstedt, JUNG, 1996, 4 Ex. an einem Pilz [BÜCHE i.l. 1999, JUNG i.l. 1999]. **Wt**+: Döttingen bei Kupferzell, 10.V.1998, 1 Ex. an einer *Polyporus*-Art an einer gestürzten Buche [REIBNITZ i.l. 1999].

Triplax rufipes (F., 1775)

No+: Kleve, Reichswald, KATTSCHAK, 20.VIII.1998, 1 Ex. an *Pleurotes* auf einer liegenden Buche [KATTSCHAK mdl. Mitt. 1998].

Dacne rufifrons (F., 1775)

Ba+: Geisingen, Unterhölzer Wald, mehrere Finder, 1992 in Anzahl in *Polyporus squamosus* an alten Eichen [ROPPEL 1990, KLESS 1998].

Familie CRYPTOPHAGIDAE

Paramecosoma melanocephalum (HBST., 1793)

St+: Wangen, Unstrutufer, ESSER, 30.V.1998, 1 Ex. - Allrode/Harz, LAU LSA, 1997, 1 Ex. (JUNG det.) in Bodenfallen [BÜCHE i.l. 1999, JUNG i.l. 1999].

Pteryngium crenatum (F., 1798)

Wf(?): Altenbeken, NWR Ochsenberg, KÖHLER, 30.VII.1998, 1 Ex. an einer toten Fichte an einem Leimring [KÖHLER Ochsenberg].

Cryptophagus populi PAYK., 1800

Th(-): Espenfeld, Götzeberg, SCHAFFRATH, 16.VII.19-20.VIII.1996 (ESSER det.) [SCHAFFRATH i.l. 1999].

Cryptophagus pubescens STURM, 1845

MV(-): Drönnewitzer Holz, ZIEGLER, 20.VII.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Cryptophagus saginatus STURM, 1845

MV(-): Duvennest, ZIEGLER, 18.XII.1990 [ZIEGLER i.l. 1999].

Cryptophagus labilis ER., 1846

Pf(-): Schaidt, NWR Mördertäufel, KÖHLER, 28.VII.1997, 3 Ex. aus einem *Lasius brunneus*-Nest in einer Eiche [KÖHLER Bienwald].

Cryptophagus corticinus THOMS., 1863

By(/): Selb, Neuhaus, RENNER, 25.V.1998, 1 Ex. [RENNER i.l. 1999].

Cryptophagus thomsoni RTT., 1875

MV+: Pritzler, ZIEGLER, 4.I.1999 [ZIEGLER i.l. 1999].

Cryptophagus scutellatus NEWM., 1834

MV(-): Duvennest, ZIEGLER, 18.XII.1990 [ZIEGLER i.l. 1999].

Cryptophagus deubeli GANGLB., 1897

Hn+: Stüntel, Rannenberg, KERSTENS, 24.VI.1956, 1 Ex. (FRANZEN det.) [coll. HERRMANN, L. SCHMIDT i.l. 1999]. **St**(-): Altenbrak/Harz, LAU LSA, 1997, zahlreich (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i.l. 1999].

Micrambe abietis (PAYK., 1798)

MV(-): Testorfer Holz, Zarentin, ZIEGLER, 3.V.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999]. **Pf**(-): Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 17.IV.1998, 1 Ex. aus altem Schlagreisig gesiebt [KÖHLER Mummelskopf].

Emphyllus glaber (GYLL., 1808)

MV+(-): Pritzier, ZIEGLER, 4.I.1999 [ZIEGLER i.l. 1999].

Antherophagus canescens GROUV., 1916

Ba+: Grissheim, Rheintrockenaue, NEUMANN, 1.VII.1994, 1 Ex. (t. ESSER) [NEUMANN i.l. 1999].

Antherophagus pallens (L., 1758)

MV+(-): Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 4.VI.1995 [ZIEGLER i.l. 1999].

Caenoscelis ferruginea (SAHLB., 1820)

St+(-): Altenbrak/Harz, LAU LSA, 1997, zahlreich (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i.l. 1999].

Atomaria impressa ER., 1846

Ba(+): der zugrundeliegende Beleg gehört zu *Atomaria plicata* (ESSER det.) [BÜCHE i.l. 1999]. **MV+**: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 3.V.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Atomaria morio KOL., 1846

MV+: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 2.IV.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Atomaria ornata HEER, 1841

Ba(+): der zugrundeliegende Beleg gehört zu *Atomaria fuscata* (ESSER det.) [BÜCHE i.l. 1999].

Atomaria ornata HEER, 1841

Hs+(-): Rudingshain, NWR Niddahänge, FLECHTNER, 1990-92 [FLECHTNER et al. 1993].

Atomaria zetterstedti (ZETT., 1838)

MV+: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 3.V.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Atomaria analis ER., 1846

Ba+(?): Horberloch, BÜCHE, 23.I.1990 - Sandhausen, NSG Pflege Schönau, BÜCHE, IV.91 in einer Barberfalle [BÜCHE i.l. 1999]. **MV+(-)**: Duvennest, ZIEGLER, 18.XII.1990 [ZIEGLER i.l. 1999].

Atomaria rubicollis BRIS., 1863

St+: Timmenrode/Quedlinburg, LAU LSA, 1996, 1 Ex. (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i.l. 1999].

Atomaria turgida ER., 1846

MV+(-): Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 3.V.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999]. **St+(-)**: Eickendorf, BÜCHE, 5.VIII.1996 in einem Nadelforst aus der Vegetation gekeschert [BÜCHE i.l. 1999].

Atomaria umbrina (GYLL., 1827)

Pf+: Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 15.V.1998, 3 Ex. an einem liegenden Buchenast gesiebt [KÖHLER Mummelskopf].

Atomaria diluta ER., 1846

Hs+: Rudingshain, NWR Niddahänge, FLECHTNER, 1990-92 - Königstein, VOGT, 1953, 1 Ex. [FLECHTNER et al. 1993, HORION 1960]. **Pf+(-)**: Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 22.VII.1998, 1 Ex. an einem Leimring an einer toten Eiche [KÖHLER Mummelskopf].

Atomaria barani BRIS., 1863

MV+: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 28.V.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Atomaria nigriventris STEPH., 1830

MV+(-): Palingen, ZIEGLER, 18.XII.1990 [ZIEGLER i.l. 1999].

Atomaria puncticollis THOMS., 1868

MV+(-): Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 28.V.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Atomaria alpina HEER, 1841

Rh+: Taben-Rodt/Saar, Urwald von Taben, KÖHLER, 15.VII.97, 1 Ex. an einer Schwefelporlings-Eiche [KÖHLER Taben].

Atomaria elongatula ER., 1846

Th+: Hainich bei Behringen, MÖLLER, VI.97, einige Ex. aus Eichenmulm mit Schwefelporlingsmycel [MÖLLER i.l. 1998].

Atomaria pulchra ER., 1846

MV+: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 27.VII.1995 im Autoke-

scher [ZIEGLER i.l. 1999].

Atomaria atrata RTT., 1875

Hs+: Rudingshain, NWR Niddahänge, FLECHTNER, 1990-92 [FLECHTNER et al. 1995].

Atomaria procerula ER., 1846

MV+(-): Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 3.V.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Atomaria lohsei JOHNS.STRAND, 1968

Ba+: Kleinkems, Rheinaue - Grissheim, Rheintrockenaue [NEUMANN i.l. 1999].

Atomaria wollastoni SHP., 1867

MV+: Gothmann, ZIEGLER, 1.VI.1994 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Atomaria badia ER., 1846

Th+: Hainich bei Behringen, MÖLLER, VI.97, 4 Ex. (t. KÖHLER) aus Eichenmulm mit Schwefelporlingsmycel [MÖLLER i.l. 1998].

Familie LANGURIIDAE

Cryptophilus integer (HEER, 1838)

Ba+: Grissheim, Rheintrockenaue, SZALLIES, 28.VII.1996, zahlreich regelmässig im Autokescher [NEUMANN i.l. 1999]. **Ba+**: Neuenburg-Grüßheim, LANGE, 31.III.1997 in Heuhaufen - Stutensee-Friedrichstal, LANGE, 6.VI.1998 am Licht [REIBNITZ i.l. 1999]. **Sd+**: Saarbrücken, Trarbacher Platz, EISINGER, 29.III.1998, 30 Ex. (KÖHLER det.) aus Kompost gesiebt [coll. EISINGER].

Familie PHALACRIDAE

Phalacrus fimetarius (F., 1775)

MV+: Klein Schmölen, Dömitz, ZIEGLER, 8.VI.1994 [ZIEGLER i.l. 1999].

Phalacrus caricus STURM, 1807

MV+(-): Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 28.V.1994 [ZIEGLER i.l. 1999].

Olibrus gerhardti FLACH, 1888

Hs+: Schlüchtern, Landrücken, SPRICK, 16.VI.1993, mehrfach auf den Blüten von *Senecio ovatus* auf einer Waldlichtung [coll. SPRICK, L. SCHMIDT i.l. 1999].

Olibrus pygmaeus (STURM, 1807)

St+(-): Rogätz, Sandkrug, BÜCHE, 15.VI.1998, 1 Ex., im Ohrekreis häufig am Kleinen Filzkraut (*Filago minima*) [BÜCHE i.l. 1999].

Olibrus flavicornis (STURM, 1807)

Hn+: Göttingen, Lengern, WILLERS, 5.VII.1997, 1 Ex. von Ruderalvegetation auf einem Bahngelände [coll. WILLERS, L. SCHMIDT i.l. 1999].

Olibrus norvegicus MUNST., 1901

Hs+: Vierheimer Heide, HÖHNER, 31.V.1996, 19.VII.1996, 30.V.1997 und 25.VII.1998, 5 Ex. [HÖHNER i.l. 1998].

Stilbus oblongus (ER., 1845)

Hn+: Ahlden/Aller, HAHLBOHM, I.X.1998, 1 Ex. aus Hochwassergebiet im Schilfbereich gesiebt [coll. HAHLBOHM, L. SCHMIDT i.l. 1999].

Familie LAEMOPHLOEIDAE

Notolaemus castaneus (ER., 1845)

By+(-): Bühlberg, Hohenecker Forst, 4.VI.1994, an toten Eichenästen - Zeubelried, 9.VII.1994 - Michelfeld, 6.VI.1996, an toten Haselästen - Leutershausen, 29.VI.1997, Eiche - Rügland-Rosenberg, 27.VI.1998, an toten Eichenästen, omnia REIBNITZ leg. [REIBNITZ i.l. 1999].

Notolaemus castaneus (ER., 1845)

Pf+: Heidesheim-Ulerborn, REIBNITZ, 25.VII.1998, an totem Eichenast [REIBNITZ i.l. 1999].

Cryptolestes duplicatus (WALT., 1839)

Hn+: nördl. Soltau, Ehrhorn, WILLERS, 14.VI.1996, 1 Ex. unter Eichenrinde [coll. WILLERS, L. SCHMIDT i.l. 1999].

Familie LATHRIDIIDAE

- Latridius consimilis* (MANNH., 1844)
MV+(-): Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 2.IV.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].
Enicmus histrio JOYTOMLIN, 1910
MV+(-): Pritzler, ZIEGLER, 4.I.1999 [ZIEGLER i.l. 1999].
Dienerella filum (AUBE, 1850)
Pf+: Schaidt, Bienwald, ZWECKER, 24.IX.1997, 1 Ex. (t. KÖHLER) [coll. Mus. Karlsruhe].
Stephostethus rugicollis (OL., 1790)
MV+(-): Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 28.V.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].
Corticaria punctulata MARSH., 1802
Sd+: Saarbrücken, Trarbacher Platz, EISINGER, 29.III.1998, 19 Ex. von Fichte, aus Reisig [coll. EISINGER].
Corticaria pineti LOHSE, 1960
Hs+: Neuhof, NWR Schönbusche, FLECHTNER, 1990-92 [DOROW et al. im Druck].
Corticaria obscura BRIS., 1863
Sd+: Saarbrücken, Saarkohlenwald, MÖLLER, VIII.1998, 1 Ex. an einem Buchenstamm bei *Lasius brunneus* [MÖLLER i.l. 1999].
Corticaria inconspicua WOLL., 1860
Sd+: Saarbrücken, Saarkohlenwald, MÖLLER, VIII.1998, 5 Ex. im Mulm einer weißfaulen Buchenruine mit *Lasius brunneus* [MÖLLER i.l. 1999].
Corticaria crenulata (GYLL., 1827)
WE+(-): Spiekerog, MAUS, 1986/87, mehrfach (DAFFNER det.) [MAUS in Vorber.].
Corticaria serrata (PAYK., 1798)
MV+(-): Stintenburg, Schaalsee, ZIEGLER, 13.VII.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].
Corticaria abietorum MOTSCH., 1867
Ba+: Belchen-Gebiet, BAUM & SCHILLER, mehrfach - Zastlertal, Präg, MOLEND [BAUM 1989, MOLEND 1996]. **Hn+(-):** Medingen, Staatsforst, WINTER, V.-X.1996, mehrfach (KÖHLER det.) in Baumkletonen an Fichte und Douglasie [KÖHLER i.l. 1998].
Corticaria linearis (PAYK., 1798)
MV+(-): Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 28.V.1994 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].
Corticaria polypori SAHLB., 1900
Ba+: Weinstetten, Rheintrockenaue, ESSER, 3.XI.1997 [NEUMANN i.l. 1999].
Corticaria lateritia MANNH., 1844
Pf+: Schaidt, NWR Stuttpferch, MATERN, 28.IX.1997, 1 Ex. (KÖHLER det.) [KÖHLER Bienwald].
Corticaria bella REDT., 1849
Pf+: Schaidt, NWR Stuttpferch, KÖHLER, 27.VII.1996, 1 Ex. im Autokescher [KÖHLER Bienwald].
Corticarina similata (GYLL., 1827)
MV+(-): Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 2.IV.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].
Corticarina lambiana (SHP., 1910)
Hs+: Rudingshain, NWR Niddahänge, FLECHTNER 1990-92 [FLECHTNER et al. 1995].
Corticarina truncatella (MANNH., 1844)
Sd+: Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i.l. 1999].
Melanophthalma curticolis (MANNH., 1844)
MV+: Gothmann, ZIEGLER, 1.VI.1994 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].
Melanophthalma maura MOTSCH., 1866
MV+: Klein Schmölen, Dömitz, ZIEGLER, 20.VI.1994 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Migneauxia orientalis RTT., 1877

MV+: Duvennest, ZIEGLER, 29.VI.1992 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Migneauxia orientalis RTT., 1877

Rh+: Ahrbrück, KÖHLER, 12.V.1998, 1 Ex. im Autokescher [coll. KÖHLER].

Familie MYCETOPHAGIDAE

Mycetophagus ater (RTT., 1879)

Wt+: Häfnerhaslach, Bannwald Sommerberg, BENSE, 28.VI.1996, 1 Ex., am Leimring [BENSE & GEIS 1998].

Mycetophagus decempunctatus F., 1801

Ba+: Geisingen, Unterhölzer Wald, REIBNITZ & LANGE, V-VI.1992, mehrere Ex. aus einem polsterartigen Baumpilz an einer alten Buche gezogen [KLESS 1998].

Mycetophagus multipunctatus F., 1792

Hn+(-): Göttingen, WILLERS, 9.VI.1998, mehrfach (t. WEIGEL) an einem Blätterpilz an einer Weißpappel [coll. WILLERS, L. SCHMIDT i.l. 1999].

Typhaea decipiens LOHSE, 1989

MV+: Duvennest, ZIEGLER, 29.VI.1992 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Familie COLYDIDAE

Langelandia anophthalma AUBÉ, 1842

Hs+: Wetzlar, Naturschutzzentrum-Außengelände, A. SCHMIDT, 1996/97, 8 Ex. [A.SCHMIDT mdl. 1998].

Langelandia anophthalma AUBÉ, 1842

Rh+(-): Bad Neuenahr, Weinberg "Sonnenberg/Görres Linden", SCHEUERN, 20/26.VII.1998, 2 Ex. aus Strohmulch ges. [SCHEUERN i.l. 1998].

Synchita separanda (RTT., 1882)

Wt?: Münchingen, MALZACHER, 20. und 21.VI.1988, 6 Ex. unter Feldahorn-Rinde und an Buchenholz-Stapel, Determination? [MALZACHER 1990].

Cicones undatus (GUER., 1844)

St+: Leipzig-Connewitz, Nonnenholz, ESSER, ohne Datum, 3 Ex. [ESSER 1998a].

Colydium elongatum (F., 1787)

Wt+(-): Dettingen bei Tübingen, BRITZ, VI.1991, 1 Ex. abends an Holzklafter anliegend [BRITZ & BERNHARD 1994].

Familie CORYLOPHIDAE

Sacium brunneum BRIS., 1863

Pf+(-): Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 11.X.1998, 2 Ex. aus verpilzten Rinden einer Buchenruine [KÖHLER Mummelskopf].
Orthoperus punctatus WANK., 1865

Ba+: Überlingen, HORION, VI.1947, 1 Ex. abends gekeschert - Kleinkems, 3.XI.1997, 1 Ex. in einem Laubgesiebe [HORION 1954b, BÜCHE i.l. 1999]. **Wt?:** Tübingen, Spitzberg, MEYER, X.1952, 1 Ex. aus verrottendem Fichtenreisig, Determination? Beleg? [MEYER 1966].
Orthoperus nigrescens STEPH., 1829

Ba+: Kleinkems & Weinstetten, Rheinaue, BÜCHE & ESSER, 3.XI.1997 (ESSER det.) - Überlingen, HORION, II.1943, 1 Ex. aus Moos gesiebt [NEUMANN i.l. 1999, HORION 1954b].

Familie ENDOMYCHIDAE

Mycetina cruciata (SCHALL., 1783)

Hs+(-): Groß-Gerau, HÖHNER, 10.V.1995, 1 Ex. aus Eichenmulm - Lampfertheimer Wald [HÖHNER i.l. 1998, NOLTE et al. 1997].

Endomychus coccineus (L., 1758)

Hs+(-): Messel, HÖHNER, 22.V.1993, 1 Ex. [HÖHNER i.l. 1998].

Familie COCCINELLIDAE*Cynegetis impunctata* (L., 1767)**Ba+**: Grissheim, Rheintrockenaue, SZALLIES, 23.V.1994 und 7.IV.1996, 2 Ex. [NEUMANN i.l. 1999].*Scymnus mimulus* CAPRA FÜRSCHE, 1967**WE+(-)**: Spiekeroog, MAUS, XII.1984, 2 Ex. (FÜRSCHE det.) aus Genist gesiebt [MAUS 1988].*Scymnus ater* KUG., 1794**Ba+**: Karlsruhe-Stadt, BÜCHE, 28.X.1993, 1 Ex. - Grissheim, Rheinaue, BÜCHE, 29.XII.1994, 1 Ex. unter Rindenschuppen an Eichen [BÜCHE i.l. 1999].*Clitostethus arcuatus* (ROSSI, 1794)**St+**: Wörlitz/Elbe, LAU LSA, 1998, 1 Ex. in (JUNG det.) einer Malaisefalle [JUNG i.l. 1999].*Hyperaspis concolor* SUFFR., 1843**Ba+**: Berghausen, BÜCHE, 3.III.1991, 1 Ex. auf einer Streuobstwiese gesiebt - Karlsruhe-Grötzingen, BÜCHE 19.VI.1984, 1 Ex. an einer Streuobstwiese gekeschert [BÜCHE i.l. 1999].*Hyperaspis reppensis* (HBST., 1783)**Hs+**: Viernheimer Heide, BRENNER, 16.VI.1994 und 18.VIII.1994, 5 Ex. (coll. HÖHNER) [HÖHNER i.l. 1998].*Hippodamia undecimnotata* (SCHNEID., 1792)**Br+**: Potsdam, Döberitzer Heide, "Große Wüste", BEIER, 12.VIII.1997, 1 Ex. (t. J. SCHULZE) in einem lückigen Corynephorum in einer Malaisefalle [BEIER 1998].*Adalia conglomerata* (L., 1758)**SH+**: Güsing, Elbe, BURGARTH, 1.V.1990 [ZIEGLER i.l. 1999].*Oenopia impustulata* (L., 1767)**Ba-**: Efringen, HARTMANN, 6.V.1922, 1 Ex. [HARTMANN 1924].**Familie CISIDAE***Xylographus bostrychoides* (DUF., 1843)**Pf+**: Worms, Bürgerpark, REIBNITZ, 24.X.1998, 1 Ex. und 8.XI.1998, 3 Ex. in einem harten Zunderschwamm an einem großen Eichenstumpf [REIBNITZ 1998].*Cis glabratus* MELL., 1848**Pf+**: Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 23.VII.1998, 7 Ex. an *Fomes* - Bingen, Binger Wald, REIBNITZ, 18.VI.1997 an Birkenporling - Scheibenhardt, Bienwald, REIBNITZ, 19.VII.1998, in Birkenporling - Steinfeld, REIBNITZ, 19.VII.1998, in *Fomitopsis pinicola* [KÖHLER Mummelskopf, REIBNITZ i.l. 1999].*Cis comptus* GYLL., 1827**Hn+(-)**: Hardegen, Fichtenforst Espol, WILLERS, 17.VII.1993, 1 Ex. (t. CONRAD) [coll. WILLERS, L. SCHMIDT i.l. 1999].*Cis punctulatus* GYLL., 1827**Hs+(-)**: Langensfeld, HÖHNER, 12.VI.1976 - 17 Belege von verschiedenen Fundorten in coll. REIBNITZ [HÖHNER i.l. 1998, REIBNITZ i.l. 1999].*Cis fagi* WALT., 1839**MV+(-)**: Testorfer Holz, Zarentin, ZIEGLER, 2.IV.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].*Cis castaneus* MELL., 1848**Hs+**: Belege von 24 Funden in Südhessen in coll. REIBNITZ [REIBNITZ i.l. 1999].*Cis dentatus* MELL., 1848**Pf+**: Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 17.IV.1998, 1 Ex. an einer toten Fichte [KÖHLER Mummelskopf].*Cis fissicornis* MELL., 1848**Br+**: Schlepzig, Unterspreewald, BENSE, 1998 (t. REIBNITZ) [BENSE i.l. 1999].*Orthocis pseudolinearis* (LOHSE, 1965)**Hs+(-)**: Beleg muß genitaliter geprüft werden. [REIBNITZ i.l. 1999].**Ne+(-)**: keine sicheren Belege [REIBNITZ i.l. 1999]. **SH**(?): keinesicheren Belege [REIBNITZ i.l. 1999]. **Wt**(+): Bei dem Beleg handelt es sich um ein nicht von *Orthocis alni* zu unterscheidendes Weibchen [REIBNITZ i.l. 1999].*Orthocis linearis* (SAHLB., 1901)**By+**: Oberaurach-Fabrikschleichach, FLOREN, 2-4.VIII.1995, 30.V.1996 und 1.VI.1996, ca. 50 Ex. in einem Eichenhochwald durch Kronenbegasung erhalten, REIBNITZ det. [REIBNITZ i.l. 1999].*Orthocis vestitus* (MELL., 1848)**MV+**: Testorfer Holz, Zarentin, ZIEGLER, 4.VI.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].**Familie LYCTIDAE***Lyctus cavicollis* LEC., 1805**Ne**: Amt Neuhaus, Neuhaus, TOLASCH, 4.VII.1995 [ZIEGLER i.l. 1999]. **Wf+**: Ahlen, RÖWEKAMP, 1 Ex. (coll. RENNER) [RÖWEKAMP & RENNER i.l. 1998].*Lyctus linearis* (GOEZE, 1777)**Wf+(-)**: Ennigerloh, RÖWEKAMP, 18.VII.1994, 1 Ex. (t. RENNER) [RÖWEKAMP & RENNER i.l. 1998].**Familie BOSTRICHIDAE***Rhyzopertha dominica* (F., 1792)**Rh+**: Spay, Rheinbogen, KÖHLER, 6.VI.1998, 3 Ex. im Autokescher [coll. KÖHLER].*Lichenophanes varius* (ILL., 1801)**Wt+**: Hohenhaslach, Teufelsberg, BENSE, VI.94, 1 Ex., aus Buchenästen gezogen [BENSE i.l. 1999].**Familie ANOBIIDAE***Episernus granulatus* WEISE, 1887**Wt+**: Dettingen bei Tübingen, BRITZ, VI.1992, 1 Ex. - Aulendorf, Brunnenholzfried, LANGE, 1 Ex. (BÜCHE det.) [BRITZ & BERNHARD 1994, BÜCHE i.l. 1999].*Ernobius nigrinus* (STURM, 1837)**MV+(-)**: Gothmann, ZIEGLER, 6.VI.1994 [ZIEGLER i.l. 1999].*Oligomerus ptilinoides* (WOLL., 1854)**Ba**: Freiburg, GEIS, in einer Holzhandlung [BÜCHE i.l. 1999].*Stegobium panicum* (L., 1758)**MV+(-)**: Gothmann, ZIEGLER, 1.VI.1994 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].*Gastrallus laevigatus* (OL., 1790)**Wt+(-)**: Freudental, aufgelassener Weinberg, BENSE, 30.VI.1993, 1 Ex., von Apfelbaum geklopft [BENSE i.l. 1999].*Gastrallus knizeki* ZAHRADNIK, 1996**Ba+**: Karlsruhe, Hardtwald-Wildpark, BÜCHE, V.1989, 5 Ex. und IV.1990 aus Kiefermisteln gezogen, weitere Fundorte: Karlsruhe-Durlach, an der Pfinz - Karlsruhe-Durlach, Turmberg - Sandhausen, NSG "Pflege Schönan" - Rheinmünster-Stollhofen, Rheinwald [BÜCHE 1998].*Xyletinus laiticollis* (DUFT., 1825)**SH+(-)**: Sylt, Ellenbogen, BURGARTH, TOLASCH, 29.VI.1997 [ZIEGLER i.l. 1999].*Xyletinus ater* (CREUTZ., 1796)**Hn+**: Wesseln, NSG Steinberg, SPRICK, 25.V.1997, 1 Ex. von abgestorbenen Eichenästen geklopft [L. SCHMIDT i.l. 1999].*Xyletinus pectinatus* (F., 1792)**Ba-**: Karlsruhe, Stutensee, NOWOTNY, VI.1949, 6 Ex. an rindenlosen Baumstämmen [NOWOTNY 1951].*Xyletinus fibyensis* LUNDBLAD, 1949**Ba+**: Grissheim, Rheintrockenaue, SZALLIES, 30.VI.1995 und 2.VII.1997, 3 Ex. von Schwarzpappel [NEUMANN i.l. 1999].*Lastoderma serricornis* (F., 1792)**Hni**: Lemke, KRENKEL, 28.IX.1998, 2 Ex. [coll. HAHLBOHM, L.

SCHMIDT i.l. 1999].

Lasioderma redtenbacheri (BACH, 1852)

By+(-): Kallmünz, Stadelberg, RENNER, 31.V.1998, 1 Ex. auf einem Trockenhang [RENNER i.l. 1999].

Stagetus borealis ISRAELSON, 1971

Ba?: Stollhofen, ehemaliger Fliegerhorst, SZALLIES, 24.V.1996, 1 Ex. im Autokescher (Bestimmung unsicher) [SZALLIES 1998].

Dorcatoma substriata HUMMEL, 1829

St+(-): Everingen, Seggerder Bruch, BÜCHE, IV.97, aus Fruchtkörpern des Erlen-Schillerporlings (*Inonotus radiatus*) gezogen (IX.96) [BÜCHE i.l. 1999].

Dorcatoma minor ZAHRADNIK, 1993

Hs+: Gross-Gerau, BETTAG, V.1990, mehrfach (t. NEUMANN) - Groß Gerau, Umg. Bannwald, KNAPP, VI.1995 in Anzahl - Lampertheim, REIBNITZ, 30.I.1993 (gezogen) - Frankfurt-Schwanheim, REIBNITZ, 19.X.1997 aus Zunderschwamm gezogen [NEUMANN & BÜCHE 1998]. *Anitys rubens* (HOFFM., 1803)

Sd+: Saarbrücken, Saarkohlenwald, MÖLLER, VIII.1998, in einer dünnen umgestürzten Schwefelporlingsseiche [MÖLLER i.l. 1999].

Familie PTINIDAE

Gibbium psylloides (CZENP., 1778)

Hni: Göttingen, Botanische Anstalten, DICKORE, XI.97, 2 Ex. in einem Herbarium [coll. WILLERS, L. SCHMIDT i.l. 1999]. **Hs+(-):** Wetzlar, Stadtgebiet, A. SCHMIDT, 1998 [A.SCHMIDT mdl. 1998].

Tipnus unicolor (PILL.MITT., 1783)

MV+(-): Duvennest, ZIEGLER, 18.XII.1990 [ZIEGLER i.l. 1999].

Ptinus binctus STURM, 1837

Ba+(-): Weinstetten, Rheintrockenaue, BÜCHE, 3.XI.1997, 1 Ex. (t. ESSER) - Geisingen, Unterhölzer Wald, LAUSBERGER, V-VI.1992 [KLESS 1998, NEUMANN i.l. 1999]. **MV+(-):** Palingen, ZIEGLER, 18.XII.1990 [ZIEGLER i.l. 1999].

Ptinus clavipes PANZ., 1806

Ba+(-): kein neuer Beleg bekannt, letzte Meldung bei HORION (1951) [BÜCHE i.l. 1999].

Ptinus dubius STURM, 1837

MV+(-): Gothmann, ZIEGLER, 6.VI.1994 [ZIEGLER i.l. 1999].

Familie OEDEMERIDAE

Anogcodes fulvicollis (SCOP., 1763)

Ba+(-): Freudenstadt/Nordschwarzwald, KESENHEIMER, VI.1955, 2 Ex. [HORION 1956].

Ischnomera caerulea (L., 1758)

Hs+: Erlensee, 21.III.1970, Hanau, 22.V.1979 und Hünfeld, 6.VI.1998, HÖHNER, 5 Ex. (gen.) [HÖHNER i.l. 1998].

Ischnomera cyanea (F., 1792)

MV+: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 28.V.1994 [ZIEGLER i.l. 1999].

Ischnomera cinerascens (PAND., 1867)

MV+(-): Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 28.V.1994 [ZIEGLER i.l. 1999]. **Ne+:** Amt Neuhaus, Forst Karrenzien, ZIEGLER, 14.V.1998 [ZIEGLER i.l. 1999].

Oedemera subulata OL., 1794

Hs+(-): der aktuellen Meldung im Katalog lag eine pfälzische Quelle zugrunde, der Art muß ein neuer Status zugeordnet werden [FRANCK 1933, KLINGER i.l. 1999].

Oedemera monticola SVIHLA, 1978

Ba+: Todtmoos, Oberer Hotzenwald, Finsterlinger Moor, MERTENS, V.98, 1 Ex. (t. Ch. NEUMANN) [MERTENS mdl. 1999].

Familie PYTHIDAE

Pytho depressus (L., 1767)

Ba+: Nordschwarzwald, Ruhestein, Bannwald Wilder See, BENSE,

1995, mehrfach Larven unter Fichtenrinde [BENSE & GEIS 1998].

Familie SALPINGIDAE

Rabocerus foveolatus (LJUNG, 1823)

Ba+: Geisingen, Unterhölzer Wald, LANGE & REIBNITZ, V-VI.1992 [KLESS 1998].

Lissodema cursor (GYLL., 1813)

MV+(-): Röttgeline Holz, ZIEGLER, 27.VI.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Familie SCRAPTIIDAE

Anaspis bohemica SCHILSKY, 1898

Ne+: Wichtenbek, MEYBOHM, 21.V.1998 [ZIEGLER i.l. 1999].

Anaspis thoracica (L., 1758)

MV+(-): Gothmann, ZIEGLER, 6.VI.1994 [ZIEGLER i.l. 1999].

Anaspis ruficollis (F., 1792)

Wt+: Tübingen, Spitzberg, MEYER, VII.1952, 1 Ex. von *Populus tremula* [MEYER 1966].

Anaspis melanostoma COSTA, 1854

Rh+: Taben-Rodt/Saar, Urwald von Taben, SCHEUERN, 30.V.1997, 2 Ex. (t. KÖHLER) [KÖHLER Taben].

Anaspis brunnipes MULS., 1856

MV+(-): Gothmann, ZIEGLER, 18.VIII.1994 [ZIEGLER i.l. 1999].

Anaspis varians MULS., 1856

Sd+: Saarbrücken, Trarbacher Platz, EISINGER, 28.VI.1998, 27 Ex. von Blüten geklopft [coll. EISINGER].

Familie ADERIDAE

Aderus populneus (CREUTZ., 1796)

MV+(-): Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 28.V.1994 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Euglenes pygmaeus (DEGEER, 1774)

Hs+(-): Neuhoof, NWR Schönbuche, FLECHTNER, 1990-92 [DOROW et al. im Druck].

Anidorus nigrinus (GERM., 1831)

MV+: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 28.V.1994 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Otolelus pruinosus (KIESW., 1861)

Ba: Karlsruhe, Stutensee, NOWOTNY, VI.1948 und IV.1951, 3 Ex. am Fuß von alten Eichen gesiebt, sicher Fehlbestimmung, da nicht bei HORION (1956) [NOWOTNY 1951, MAUS i.l. 1999].

Familie ANTHICIDAE

Anthicus luteicornis SCHM., 1842

HN+: Einbeck, Salzderhelden, WILLERS, 28.V.1989, 1 Ex. an einem trockenen Wiesengraben [coll. WILLERS, L. SCHMIDT i.l. 1999].

Omonadus formicarius (GOEZE, 1777)

MV+(-): Duvennest, ZIEGLER, 29.VI.1992 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Stricticomus tobias (MARS., 1879)

MV+: Testorfer Holz, Zarrentin, ZIEGLER, 27.VII.1995 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Familie MELOIDAE

Lytta vesicatoria (L., 1758)

Wt+(-): Heilbronn, REIBNITZ, 12.VI.1985, 1 Ex. [WURST 1986].

Meloe cicatricosus LEACH, 1811

Hs+(-): der Angabe im Katalog liegt nur eine pfälzische Quelle zugrunde, die Art ist für Hessen zu streichen [KLINGER i.l. 1999].

Meloe coriarius BR.ER., 1832

Ba-: Grötzingen bei Karlsruhe, HOHNDOF, V.1929 [HORION 1956].

Meloe hungarus SCHRR., 1776

Ba.: Mehrere Funde: Heidelberg, Kaiserstuhlgebiet [HORION 1956].

Familie MORDELLIDAE

Variimorda villosa (SCHRANK, 1781)

MV+(?): Testorfer Holz, Zarentin, ZIEGLER, 27.VII.1995 [ZIEGLER i.l. 1999].

Mordella huetheri ERM., 1956

Sd+: Saarhölzbach, Saaraue, KÖHLER, 9.VII.1997, 3 Ex. an einem Strafenrain gekeschert [KÖHLER 1998g].

Curtimorda bisignata (REDT., 1849)

Br+: Berlin-Treptow, ehemaliger Mauerstreifen Johannisthal, BÜCHE, ESSER & NEUMANN, 20.VI.1998, 3 Ex. an einem liegenden Nadelholzstamm [ESSER 1998b]. **Sn+**(-): Rohrbach, Wald östl. NSG, BENSE, 19.VI.1997, 1 Ex. am Leimring [BENSE 1998].

Mordellistenula perrisi (MULS., 1856)

Br+(-): Berlin-Köpenick, Püttberge Wilhelmshafen, ESSER, ohne Datum, 1 Ex. auf einer Apiaceen-Blüte [ESSER 1998b]. **MV+**: Gothmann, ZIEGLER, 6.VI.1994 [ZIEGLER i.l. 1999]. **Rh+**: Bacharach-Steeg, Weinbergslagen, KÖHLER, 5.VI.1996, 1 Ex. [KÖHLER 1998e]. **St+**: Bertingen, Elbaue, BÜCHE, 4.VI.1998, sehr zahlreich auf einem Trockenrasen auf Blüten von *Jasione montana* - Wenddorf, BÜCHE, 14.VI.1998 - Zielitz, ESSER, 6.VIII.1998 [BÜCHE i.l. 1999].

Mordellistena parvula (GYLL., 1827)

St+(-): Bebertal, NSG Wellenberge, BÜCHE, 17.VI.1997, 1 Ex. - Olbetal, BÜCHE, 4.VII.1997, 1 Ex. [BÜCHE i.l. 1999].

Mordellistena stoeckleini ERM., 1956

Ba+: Hartheim, Rheinaue, BÜCHE, 15.V.1997, mehrfach auf einer schütter bewachsenen Trockenrasenfläche gekeschert [BÜCHE i.l. 1999].

Mordellistena bicoloripilosa ERM., 1967

Ba+: Karlsruhe-Neureut, BÜCHE, 11.VI.1989, 1 Männchen [BÜCHE i.l. 1999].

Mordellistena bicoloripilosa ERM., 1967

Pf+: Neulauterburg, Bienwald, BÜCHE 21.VI.1992, zahlreich auf einer trockenen Rasenfläche von *Artemisia vulgaris* geklopft [BÜCHE i.l. 1999]. **St+**: Wenddorf, BÜCHE, 14.VI.1998, 3 Ex. auf einer Feldbrache von Rainfarn (*Tamacetum vulgare*) [BÜCHE i.l. 1999].

Mordellistena kraatzii EM., 1876

St+: Hödingen, Windmühlenrasen, BÜCHE, 31.V.1996, 1 Ex. auf einem brachgefallenen Trockenrasen gekeschert [BÜCHE i.l. 1999].

Mordellistena pseudobrevicauda ERM., 1963

Rh(+): der Beleg vom Koppelstein bei Braubach (KOCH 1993) gehört zu *Mordellistena brevicauda* (KÖHLER det.) [KÖHLER 1998e].

Mordellistena confinis COSTA, 1854

Rh(?): der Beleg vom Bausenberg bei Niederzissen/Eifel (KOCH 1978) gehört zu *Mordellistena reitteri* (HORAK det.) [KÖHLER 1998e].

Mordellistena luteipalpis SCHILSKY, 1895

St+: Rogätz, Elbtal bei Sandkrug, BÜCHE, 9.VI.1998 & ESSER, 13.VI.1998, zahlreich von einem blühenden Bestand der Eselswolfsmilch (*Euphorbia esula*) gekeschert [BÜCHE i.l. 1999].

Mordellistena purpureonigrans ERM., 1963

Hs+: Darmstadt, VOGT, 22.X.1961, 1 Ex. (coll. HÖHNER) [HÖHNER i.l. 1998]. **St+**: Olbetal, BÜCHE, 4.VII.1997, BÜCHE, 2 Ex. auf einem *Stipa capillata*-Steppenrasen [BÜCHE i.l. 1999].

Mordellistena hollandica ERM., 1966

No(+): Belege fehlen oder sind falsch determiniert [KÖHLER 1998e]. **Rh**(+): Belege fehlen oder sind falsch determiniert [KÖHLER 1998e].

Mordellistena neuwaldeggiana (PANZ., 1796)

Sn+: Rohrbach, Wald östl. NSG, BENSE, 1997, am Leimring [BENSE 1998].

Mordellistena nanula ERM., 1967

MV+: Feldberg, DIECKMANN, 27.VII.1965, Typus [ERMISCH 1967].

Mordellistena pseudonana ERM., 1956

Wt+: Tübingen, Spitzberg, MEYER, V.1952-54, 1 Ex. auf Blüte von

Anthriscus silvestris [MEYER 1966].

Mordellistena acuticollis SCHILSKY, 1895

St+(-): Ballenstedt, Gegensteine, 13.VII.1995, zahlreich - Wenddorf, 14.VI.1998, 1 Ex. - Rogätz, Sandkrug, 13.VI.1998, 3 Ex., jew. BÜCHE leg. an *Artemisia campestris* [BÜCHE i.l. 1999].

Mordellochroa tourmeri EM., 1876

Wt+: Markgröningen, KÖSTLIN, 2.VII.1963, 1 Ex. [HARDE & KÖSTLIN 1965].

Familie MELANDRYIDAE

Eustrophus dermestoides (F., 1792)

Ba+: Grenzach-Wyhlen, SCHILLER, 14.XI.1976 und 11.I.77, 7 Ex. in Schwefelporling an Kirschbaum [REIBNITZ 1992].

Hallomenus axillaris (ILL., 1807)

MV+(-): Testorfer Holz, Zarentin, ZIEGLER, 26.VI.1995 im Autokecher [ZIEGLER i.l. 1999].

Orchesia luteipalpis MULS., 1857

Sn+: Thallwitz, Lauch, BENSE, 1996 und 1997, mehrfach, an Erlen-Schillerporling und an einem Leimring [BENSE 1998]. **St+**: Everingen, Seggerder Bruch, BÜCHE, IX.96, zahlreich in Fruchtkörpern des Erlen-Schillerporlings (*Inonotus radiatus*) beobachtet [BÜCHE i.l. 1999].

Orchesia fasciata (ILL., 1798)

St+(-): Seebenauer Holz, ZIEGLER, 3.VII.1993 [ZIEGLER i.l. 1999].

Anisoxya fuscata (ILL., 1798)

MV+(-): Stintenburg, Schaalsee, ZIEGLER, 13.VII.1995 [ZIEGLER i.l. 1999]. **Sn+**: Thallwitz, Lauch, BENSE, VII.97, 2 Ex., von Laubholzstäben geklopft [BENSE 1998].

Abdera affinis (PAYK., 1799)

Sn+(-): Thallwitz, Lauch, BENSE, 4.VII.1996, 2 Ex., an Erlen-Schillerporling [BENSE 1998]. **St+**(-): Everingen, Seggerder Bruch, BÜCHE, IV.97, aus Fruchtkörpern des Erlen-Schillerporlings (*Inonotus radiatus*) gezogen (IX.96) [BÜCHE i.l. 1999].

Abdera flexuosa (PAYK., 1799)

St+(-): Everingen, Seggerder Bruch, BÜCHE, IV.97, aus Fruchtkörpern des Erlen-Schillerporlings (*Inonotus radiatus*) gezogen (IX.96) [BÜCHE i.l. 1999].

Abdera quadrifasciata (CURT., 1829)

By+: Iphofen, Schloß Schwanberg, REIBNITZ, 26.VI.1996, 3 Ex. an *Stereum hirsutum* an toten Haselästen [REIBNITZ 1996].

Abdera triguttata (GYLL., 1810)

MV+(-): Stintenburg, Schaalsee, ZIEGLER, 13.VII.1995 [ZIEGLER i.l. 1999].

Hypulus quercinus (QUENSEL, 1790)

No+(-): Wesel, Diersfordter Wald, SCHARF, Funddaten? [coll. SCHARF].

Zilora sericea (STURM, 1807)

Ba+: Calw-Siehdichfür, Zellerholz, SZALLIES, 5.VI.1996 im Autokecher [SZALLIES 1998].

Familie TETRATOMIDAE

Tetratoma desmarestii LATR., 1807

Wt+: Ludwigsburg, Favoritenpark, NOWOTNY, 10.X.1951, 2 Ex. [REIBNITZ 1992].

Tetratoma ancora F., 1790

MV+(-): Röggeleiner Holz, ZIEGLER, 25.VII.1995 im Autokecher [ZIEGLER i.l. 1999].

Familie LAGRIIDAE

Lagria atripes MULS.GUILLB., 1855

MV+: Klein Schmölen, Dömitz, ZIEGLER, 8.VI.1994 [ZIEGLER i.l. 1999].

Familie ALLECULIDAE

Allecula morio (F., 1787)

Sd+: Saarbrücken, WaldSG Steinbachtal, MÖLLER, Funddaten unbekannt [coll. MÖLLER, EISINGER i.l. 1999].

Allecula rhenana BACH, 1856

Sd+: Saarbrücken, Saarkohlenwald, MÖLLER, VIII.1998, 1 Ex. nachts an einer großen Buchenuine [MÖLLER i.l. 1999].

Prionychus melanarius (GERM., 1813)

Sd+: Saarböhlzbach, Nähe Steinbruch Arweiler, LILLIG, 8.VIII.1998, 1 Ex. aus morscher Birke [coll. LILLIG, EISINGER i.l. 1999].

Mycetochara flavipes (F., 1792)

Br+(-): Schlepzig, Unterspreewald, BENSE, 1998, mehrfach, an Leimringen [BENSE i.l. 1999].

Mycetochara axillaris (PAYK., 1799)

Ba-: Karlsruhe, Stutensee, NOWOTNY, VI.1949, 1 Ex. [NOWOTNY 1951].

Mycetochara humeralis (F., 1787)

Ba+: Karlsruhe, Stutensee, NOWOTNY, V.1948, 3 Ex. an stehenden Eichen und in Mulm [NOWOTNY 1951].

Omophlus lepturoides (F., 1787)

By(+): "Allacher Forst München" beruht auf Fehlbestimmung, die Art ist also verschollen (vgl. HORION 1956) [KÖHLER i.l. 1999]. **Hs**(+): Der Fundort bei BETTAG et al. (1980) liegt an der Nahe, nicht in Hessen. [KÖHLER i.l. 1999].

Familie TENEBRIONIDAE

Bolitophagus reticulatus (L., 1767)

Sd+: Saarböhlzbach, Hundscheider Bach, LILLIG, 16.V.1998, 1 Ex. aus verpilztem Holz [coll. LILLIG, EISINGER i.l. 1999].

Platydemus dejeanii CAST.BRULLE, 1831

St+: Wörlitz, Elbaue, GEIS & TRÖGER, 19.VII.1997, 1 Ex. an einer alten Heldbockeiche [GEIS & TRÖGER 1997].

Alphitophagus bifasciatus (SAY, 1823)

MV(-): Duvennest, ZIEGLER, 29.VI.1992 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Myrmexichenus subterraneus (CHEVR., 1835)

MV+: Pritzier, ZIEGLER, 4.I.1999 [ZIEGLER i.l. 1999].

Myrmexichenus vaporariorum (GUER, 1843)

MV+: Duvennest, ZIEGLER, 29.VI.1992 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Corticus bicoloroides (ROUB., 1933)

Hs+: Frankfurt, Enkheimer Wald, 6.IX.1997, 1 Ex. aus morschem Holz eines Hainbuchen-Dürständers (d 15-20 cm) [FLECHTNER i.l. 1999]. **St+**: Schartau, ESSER, 21.VI.1998, 2 Ex. an einer durch *Agrilus ater* zum Absterben gebrachten, jungen Hybridpappel [BÜCHE i.l. 1999].

Palorus depressus (F., 1790)

Sn(-): Leipzig, Burgaue, BENSE, 1996 - Rohrbach, Wald östl. NSG, BENSE, 1997 [BENSE 1998].

Tribolium madens (CHARP., 1825)

Hs+: Hanau, DEHNERT, 16.X.1976, 2 Ex. in einer Wohnung [HÖHNER i.l. 1998].

Tribolium confusum DUVAL, 1863

Wf(-): Ennigerloh, RÖWEKAMP, 14.VIII.1996, 1 Ex. (t. RENNER) [RÖWEKAMP & RENNER i.l. 1998].

Gnatocerus cornutus (F., 1798)

Ba+: Karlsruhe, Universitätsgelände, NEUMANN, XI.88, 1 Ex. synanthrop [NEUMANN i.l. 1999]. **Ne+**: Oldendorf, Luhe, HENGMITH, 20.I.1999 [ZIEGLER i.l. 1999].

Latheticus oryzae WTRH., 1880

Ne(+): mehrere Funde im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Uloma culinaris (L., 1758)

Ba+: Karlsruhe, Stutensee, HÜTHER, VII.1933, mehrfach an alten Eichen - Schwetzingen, RÖBEN, V.1920, an morscher Kiefer -

Karlsruhe-Durlach, Oberwald, Knapp, 25 Ex. unter der Rinde einer abgestorbenen und gefällten Eiche [HORION 1956, KNAPP 1998]. **St**(-): Stendal, NSG Mahlpfähler Fenn, LÜCKMANN, 30.VII.1997, 2 Ex. (t. STARKE) unter morscher Rinde einer alten Eiche [LÜCKMANN 1998].

Uloma rufa (PILL.MITT., 1783)

Wt-: Hirsau/Schwarzwald, LOHSE, XII.1928, mehrfach - Haselbach-Gmünd, DOLDERER, VI.1933, 4 Ex. aus rotfaulem Fichtenstumpf [HORION 1956].

Stenomax aeneus (SCOP., 1763)

Hs(+): der aktuellen Meldung im Katalog lag eine pfälzische Quelle zugrunde, der Art muß ein neuer Status zugeordnet werden [HEYDEN 1904, KLINGER i.l. 1999].

Familie TROGIDAE

Trox perrisii FAIRM., 1868

Ba+: Freiburg-Ebringen, Schönberg, BAUM, IV.91, 1 Ex. (NEUMANN det.) in einer hohlen Buche - Karlsruhe, Hardtwald, NEUMANN, 28.I.1990, 1 Ex. (t. GLADITSCH) in einer Spechthöhle in einer umgestürzten Eiche [NEUMANN i.l. 1999].

Familie GEOTRUPIDAE

Trypocopris pyrenaicus (CHARP., 1825)

Ba-: "Schwarzwald", coll. BREIT, 6 Ex. [HORION 1958, KRELL & FERY 1992].

Familie SCARABAEIDAE

Caccobius schreberi (L., 1767)

Wt-: Reutlingen, nach KELLER (1864) [HORION 1958].

Onthophagus semicornis (PANZ., 1798)

By+: Erlangen, Exerzierplatz, LAMPERSTORFER, 6.IX.1997 [SCHAFFRATH i.l. 1999].

Onthophagus vacca (L., 1767)

Wt+: Ludwigsburg, Favoritenpark, NOWOTNY, IV.1952, mehrfach in Darmhirschlösung [HORION 1958].

Aphodius brevis (ER., 1848)

WE(-): Spiekeroog, MAUS, VII.1982, aus Pferdemit [MAUS 1983].

Aphodius quadriguttatus (HBST., 1783)

Hs(-): Die Meldung von WEBER (1903) beruht vermutlich auf einer Namensverwechslung, die Art ist daher zu streichen. [SCHAFFRATH 1994].

Aphodius pubescens STURM, 1800

Hs?(-): Bei den Belegen in der Sammlung RIEHL (Marburg) handelt es sich um *Aphodius prodromus*, das Artvorkommen ist fraglich [SCHAFFRATH 1994].

Aphodius obscurus (F., 1792)

Ba(-): Todtnau, Feldberg, HORION & KARDASCH, 1950, zahlreich [HORION 1951].

Aphodius merdarius (F., 1775)

Hs(-): Hofgeismar, Galgenberg, FOLWACZNY, 4.V.1930, 5 Ex. [SCHAFFRATH 1994].

Aphodius convexus (ER., 1848)

Hn+: Stadtdoldendorf, Vaseberg, L. SCHMIDT, 9.V.1998, 1 Ex. an Schafskot [coll. L. SCHMIDT].

Aphodius borealis GYLL., 1827

Hs+: Sandborn, Reinhardswald und Hirschhagen/Uengsterode, Meißner, SCHAFFRATH, 31.V.19-8.IX.vor 1994 [SCHAFFRATH 1994].

Aphodius nemoralis ER., 1848

Hs+: Giesel, Schieferain, SCHAFFRATH, 7.IV.1994 - Fulda, Nonnenrod, FRISCH, 30.III.1981 [SCHAFFRATH i.l. 1999].

Aphodius ictericus (LAICH., 1781)

Hn(-): Hildesheim, Osterberg, L. SCHMIDT, VI.-VIII.97, mehrfach an Schafskot [coll. L. SCHMIDT].

Aphodius lugens CREUTZ., 1799

Ba+: Achkarren, Kaiserstuhl, NOWOTNY, VI.1953, 1 Ex. am Licht [HORION 1958].

Aphodius corvinus ER., 1848

Hs+(-): Rudingshain - Habichtswald - Dörnberg - Reinhardswald - Meißner - Kaufunger Wald - Gatter Edersee, verschiedene Finder [FLECHTNER et al. 1995, SCHAFFRATH 1994].

Aphodius plagiatus (L., 1767)

By+(-): Erlangen, Exerzierplatz, LAMPERSTORFER, 12.III.1997 - Bad Neustadt a. S., NIEDLING, 5.VII.1997 (SCHAFFRATH det.) [SCHAFFRATH i.l. 1999].

Aphodius varians DUFT., 1805

Hs-(-): Hofgeismar, Kelzer Berg, FOLWACZNY, 9.V.1929, 7 Ex. und 21.V.1929, 1 Ex. in Schafskot [SCHAFFRATH 1994].

Heptaaulacus testudinarius (F., 1775)

Ba-(-): Karlsruhe, NOWOTNY, III.1946, 2 Ex. aus Schafskot [HORION 1958].

Euheptaaulacus villosus (GYLL., 1806)

Hs+: Niddastornfeld, Nordhang, A. SCHMIDT, 1998, 65 Ex. in Barberfallen [A.SCHMIDT mdl. 1998].

Omaloplia nigromarginata (KÜST., 1849)

Hs-: alte Funde im Rhein-Main-Gebiet [RÖSSNER 1995].

Miltotrogus aequinoctialis (HBST., 1790)

Wt-: Erlaheim, DOLDERER [KRELL 1993].

Chaetopteropia segetum (HBST., 1783)

Ba-: Kehl, LOHSE, VI.1940, 1 Ex. [HORION 1958].

Gnorimus variabilis (L., 1758)

By+(-): Rohrbrunn, Rohrberg, KÖHLER, 30.VIII.1998, Torso und Larven in liegender Eiche [coll. KÖHLER].

Trichius zonatus GERM., 1794

Hs(+): der aktuellen Meldung im Katalog lag eine pfälzische Quelle zugrunde, der Art muß ein neuer Status zugeordnet werden [KLINGER i.l. 1999, coll. KLINGER].

Familie LUCANIDAE

Aesalus scarabaeoides (PANZ., 1794)

Hs(+): der aktuellen Meldung im Katalog lag eine pfälzische Quelle zugrunde, der Art muß ein neuer Status zugeordnet werden [KLINGER i.l. 1999, coll. KLINGER].

Familie CERAMBYCIDAE

Ergates faber (L., 1767)

Ba+: Mannheim, Viernheimer Wald, KRÄTSCHMER, 1965, 1 Ex. [HORION 1974].

Nothorhina punctata (F., 1798)

Wt+: Umg. Tübingen, FABER beob., 1969 u. 1970, mehrfach [HORION 1975].

Tetropium gabrieli WEISE, 1905

Ba+: Baden-Baden, GAUSS, 1950 [HORION 1974].

Akimerus schaefferi (LAICH., 1784)

Ba+(-): Schützingen, Schützingen Wald, RUMMETSCH, 26.VI.1921, 1 Ex. - Maulbronn [BENSE i.l. 1999, HORION 1974]. **Wt(+):** der von Horion genannte Fundort (b. Maulbronn) liegt im heutigen Baden [BENSE i.l. 1999].

Cortodera humeralis (SCHALL., 1783)

No+: Windeck-Au, SCHUMACHER, 5.V.1995, 1 Ex. [BAUMANN 1997].

Sd+: Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i.l. 1999].

Corymbia fulva (DEGEER, 1775)

Wt(+): nach Revision von Belegen zu streichen [BENSE i.l. 1999].

Corymbia cordigera (FUSSL., 1775)

Ba-: Rastatt, nach DAMBACHER 1828 [HORION 1974]. **No:** Duisburg-Homberg, PLIESTER, vor 1849, nach FÖRSTER (1849) sicher Fehltermination [BAUMANN 1997].

Lepturobosca virens (L., 1758)

Ba(-): Schwarzwald, Funde vor 1900 [HORION 1974]. **Wt?(+):** Tübingen, Schönbuch, eine sehr zweifelhafte Meldung von ECKERT & LAUTERBACH [BENSE i.l. 1999].

Trichoferus griseus (F., 1792)

Ba: Grissheim, Rheinaue, MATERN, 4.VIII.1998, 1 Ex. (KÖHLER det.) von Ulme geklopft [NEUMANN i.l. 1999].

Molorchus marmottani BRIS., 1863

Hs(+): der aktuellen Meldung im Katalog lag eine pfälzische Quelle zugrunde, der Art muß ein neuer Status zugeordnet werden [HEYDEN 1904, KLINGER i.l. 1999].

Rosalia alpina (L., 1758)

Ba+(-): Imdorf, Donautal, BENSE, seit 1992, mehrfach, an exponiertem Buchenholz [BENSE i.l. 1999]. **Nov:** Köln-Mitte, AERTS, 1920, 1 Ex., verschleppt [BAUMANN 1997].

Ropalopus clavipes (F., 1775)

Hs(+): der Angabe im Katalog liegt nur eine pfälzische Quelle zugrunde, die Art ist für Hessen zu streichen [KLINGER i.l. 1999].

Xylotrechus stebbingi GAHAN, 1906

Ba: Kippenheim bei Lahr, MEINEKE, 11.VII.1994, 1 Ex. (BENSE det., coll. NEUMANN) in einer Lichtfalle [NEUMANN i.l. 1999].

Clytus rhamni GERM., 1817

No?: Velbert-Neviges, Wuppertal-Elberfeld und Duisburg-Homberg, vor 1900, ohne Belege [BAUMANN 1997].

Plagionotus floralis (PALL., 1773)

No: Velbert-Neviges, DE ROSSI, vor 1896, 1 Ex., nach GEILENKEUSER (1896), sicher Fehltermination [BAUMANN 1997].

Chlorophorus varius (MÜLL., 1766)

Hs(+): der Angabe im Katalog liegt nur eine pfälzische Quelle zugrunde, die Art ist für Hessen zu streichen [KLINGER i.l. 1999].

Chlorophorus herbstii (BRAHM, 1790)

Hs(+): der Angabe im Katalog liegt nur eine pfälzische Quelle zugrunde, die Art ist für Hessen zu streichen [KLINGER i.l. 1999].

Chlorophorus pilosus (FORST., 1771)

Wtv: Weikersheim, PFIZER, VII.68, mehrfach [HORION 1974].

Isotomus speciosus (SCHNEID., 1787)

Wtv: Ringingen, GAUSS, V.50, 1 Ex. [HORION 1974].

Purpuricenus kaehleri (L., 1758)

Ba+(-): Vogtsburg, Kaiserstuhl, GAUSS, 15.VIII.1963, 1 Ex. auf einer Blüte [GAUSS 1963]. **Hs(+):** der Meldung im Katalog lag eine pfälzische Quelle zugrunde, der Art muß ein neuer Status zugeordnet werden [PAULUS 1973, KLINGER i.l. 1999].

Parmena baltus (L., 1767)

Ba+: Umkirch, Mooswald, VI.98, 1 Ex. aus einem Efeuast gezogen [ROPPEL 1998].

Monochamus sutor (L., 1758)

Hs(+): der Angabe im Katalog liegt nur eine pfälzische Quelle zugrunde, die Art ist für Hessen zu streichen [KLINGER i.l. 1999].

Mesosa curculionoides (L., 1761)

Ba+(-): Rheinwälder westlich des Kaiserstuhls, PAPPERITZ, 1952 - Freiburg, 1959 und Konstanz, 1963, KLESS leg. [HORION 1974].

Leiopus punctulatus (PAYK., 1800)

No: Krefeld, VOM BRUCK, vor 1900, 2 Ex., nach EVERTS (1901), Fehlbestimmung (ROETTGEN 1911) [BAUMANN 1997].

Acanthocinus reticulatus (RAZM., 1789)

Wt-: Lorch, DOLDERER, vor 1950 [coll. DOLDERER, BENSE i.l. 1999].

Exocentrus adpersus MULS., 1846

Sd+: Saarbrücken, Saarkohlenwald, MÖLLER, VIII.1998, 1 Ex. am Licht [MÖLLER i.l. 1999].

Agapanthia cynarae (GERM., 1817)

No: Duisburg-Homberg, PLIESTER, vor 1849, 1 Ex., nach FÖRSTER (1849), Fehlbestimmung [BAUMANN 1997].

Saperda perforata (PALL., 1773)

Hs(+): der aktuellen Meldung im Katalog lag eine pfälzische Quelle zugrunde, der Art muß ein neuer Status zugeordnet werden [HEYDEN 1904, KLINGER i.l. 1999]. **Wt+(-):** Stuttgart, BERNHAUER, IV.1964, aus Larve gezogen [HORION 1974].

Menesia bipunctata (ZOUBK., 1829)

Hs(+): der aktuellen Meldung im Katalog lag eine pfälzische Quelle zugrunde, der Art muß ein neuer Status zugeordnet werden [HEYDEN 1904, KLINGER i.l. 1999].

Oberea erythrocephala (SCHRK., 1776)

Wt+(-): Ringingen bei Ulm, GAUSS, 7.1953, 1 Ex. [HORION 1974].

Phytoecia scutellata (F., 1792)

Ba+: Untergrombach, Michaelsberg, NOWOTNY, VI.1949 [HORION 1974]. **Hs(+):** der Angabe im Katalog liegt nur eine pfälzische Quelle zugrunde, die Art ist für Hessen zu streichen [KLINGER i.l. 1999].

Phytoecia uncinata (REDT., 1842)

Ba+: Kaiserstuhl, ZUR STRASSEN, VI.1952, 1 Ex. [HORION 1974].

Phytoecia molybdaena (DALM., 1817)

Hs(+): der Angabe im Katalog liegt nur eine pfälzische Quelle zugrunde, die Art ist für Hessen zu streichen [KLINGER i.l. 1999].

Tetrops starkii CHEVR., 1859

No+: Meerbusch-Strümp, Schloß Pesch, EINWALLER, 3.VI.1994, t. KÖHLER [BAUMANN 1997].

Familie CHRYSOMELIDAE

Donacia versicolorea (BRAHM, 1790)

Hs(+): der aktuellen Meldung im Katalog lag eine pfälzische Quelle zugrunde, der Art muß ein neuer Status zugeordnet werden [HEYDEN 1904, KLINGER i.l. 1999].

Donacia malinovskyi AHR., 1810

Ne(+): die Meldung beruhte auf einer Fehlbestimmung [ZIEGLER i.l. 1999].

Donacia sparganii AHR., 1810

St+: Stendat, Schönhauser Damm, Trübenbruch, SPRICK, 8.VII.1997, 1 Ex. von *Spartanium emersum* [coll. SPRICK, L. SCHMIDT i.l. 1999].

Donacia obscura GYLL., 1813

Ba+: Belchen-Gebiet, Nonnenmattweiher, 910m, BAUM, VI.+IX.?, 2 Ex. [BAUM 1989].

Donacia thalassina GERM., 1811

Ba-: Mannheim, FÖRSTER, ohne Datum, HARTMANN, ohne Datum, an Tümpelufer [HARTMANN 1907].

Donacia tomentosa AHR., 1810

Hs(+): der Angabe im Katalog liegt nur eine pfälzische Quelle zugrunde, die Art ist für Hessen zu streichen [KLINGER i.l. 1999].

Plateumaris braccata (SCOP., 1772)

Hn+: Wolfsburg, ohne Finder, VIII.1972, 1 Ex. (M. SCHMITT det., coll. MAUS) [MAUS i.l. 1999].

Oulema duftschmidi (REDT., 1874)

Sd+: Altforweiler, Häsfeld, EISINGER, 25.V.1997, 1 Ex. [coll. EISINGER].

Labidostomis tridentata (L., 1758)

Ba+: Efringen, 30.V.19 vor 1926, LAUTERBORN, auf Eichengebüsch - Größheim, MAUS & NEUMANN, 5.VI.1993 und 11.V.1994, 3 Ex. [LAUTERBORN 1926, MAUS & MAUSER in Vorber.]. **Hn-:** Braunschweig, Querumer Holz, STEINHAUSEN, 30.V.1949, 1 Ex. [coll. STEINHAUSEN, L. SCHMIDT i.l. 1999].

Labidostomis lucida (GERM., 1823)

Hs(+): der aktuellen Meldung im Katalog lag eine pfälzische Quelle zugrunde, der Art muß ein neuer Status zugeordnet werden [ERBER 1983, KLINGER i.l. 1999].

Labidostomis longimana (L., 1761)

Hn+: Langelsheim, Kahnstein, SPRICK & E. PALM, 21.VI.1998, 1 Ex. [coll. SPRICK, L. SCHMIDT i.l. 1999].

Pachybrachis hieroglyphicus (LAICH., 1781)

Hn-: Alfeld, ohne Datum, 2 Ex. (L. SCHMIDT det.) [coll. Mus. Hannover, L. SCHMIDT i.l. 99].

Pachybrachis sinuatus MULS.REY, 1859

Hs(+): der Angabe im Katalog liegt nur eine pfälzische Quelle zugrunde, die Art ist für Hessen zu streichen [KLINGER i.l. 1999].

Pachybrachis picus WEISE, 1882

Ba+(-): Belchen-Gebiet, Utzenfluh, BAUM, mehrere Funde [BAUM 1989].

Cryptocephalus coryli (L., 1758)

Hs+: Darmstadt, 27.V.1982, 3.VI.1983 und 27.V.1988, HÖHNER, 4 Ex. an *Tilia* - Lorch, SCHINDLER, 26.V.1963, 1 Ex. [HÖHNER i.l. 1998].

Cryptocephalus distinguendus SCHNEID., 1792

Ba+(-): Hotzenwald, Spielmannswies, MERTENS, an *Betula pubescens* [MAUS i.l. 1999].

Cryptocephalus primarius HAR., 1872

Hs(+): der Angabe im Katalog liegt nur eine pfälzische Quelle zugrunde, die Art ist für Hessen zu streichen [KLINGER i.l. 1999].

Cryptocephalus punctiger PAYK., 1799

Ba+: Grissheim, Rheintrockenaue, NEUMANN, 16.VI.1993, 2 Ex. (t. MAUS) [NEUMANN i.l. 1999]. **Hn-:** Barsinghausen, Klosterforst, , ohne Datum, 1 Ex. (t. SPRICK) [coll. Mus. Hannover, L. SCHMIDT i.l. 99].

Cryptocephalus parvulus MÜLL., 1776

Rh+(-): Taben-Rodt/Saar, Urwald von Taben, KÖHLER, 30.V.1997, 2 Ex. auf einer Blockhalde von Birken geklopft [KÖHLER Taben].

Cryptocephalus quadripustulatus GYLL., 1813

MV+(-): Gothmann, ZIEGLER, 1.VI.1994 [ZIEGLER i.l. 1999].

Cryptocephalus bilineatus (L., 1767)

Hn-: Hannover, Annateich, , 8.VII.1935, 2 Ex. (L. SCHMIDT det.) [coll. Mus. Hannover, L. SCHMIDT i.l. 99].

Cryptocephalus fulvus GOEZE, 1777

Sd+: Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i.l. 1999].

Cryptocephalus macellus SUFFR., 1848

Hs+: Lorch, Weinbergslagen, HÖHNER, 13.VII.1996 und 27.VII.1996, 11 Ex. auf Eichen [HÖHNER i.l. 1998].

Cryptocephalus populi SUFFR., 1848

Hs(+): der Angabe im Katalog liegt nur eine pfälzische Quelle zugrunde, die Art ist für Hessen zu streichen [KLINGER i.l. 1999].

Oomorplus concolor (STURM, 1807)

Hn+: Langelsheim, Bredelemer Holz, V.96, 25 Ex. [JUNG 1998].

Pachnophorus pilosus (ROSSI, 1790)

Hn-: Hildesheim, ohne Datum, 1 Ex. (L. SCHMIDT det.) [coll. Mus. Hannover, L. SCHMIDT i.l. 99].

Chrysolina cerealis (L., 1767)

Hs(+): der aktuellen Meldung im Katalog lag eine pfälzische Quelle zugrunde, der Art muß ein neuer Status zugeordnet werden [PATTRI 1936, KLINGER i.l. 1999].

Chrysolina purpurascens (GERM., 1817)

Hs+: Rudingshain, NWR Niddahänge, FLECHTNER, 1992-93 - weitere ältere Nachweise [FLECHTNER et al. 1993, SCHÜRMAN 1968].

Chrysolina oricalcia (MÜLL., 1776)

Sd+(-): Niederkirchen, Biotop, EISINGER, 2.VII.1985, 1 Ex. aus Mähgut [coll. EISINGER].

Chrysolina fuliginosa (OL., 1807)

Hn-: Ringelheim, VI.1908, 2 Ex. (L. SCHMIDT det.) [coll. Mus. Hannover, L. SCHMIDT i.l. 99].

Chrysolina hyperici (FORST., 1771)

MV+: Rüterberg, Elbe, ZIEGLER, 31.VIII.1994 [ZIEGLER i.l. 1999].

Chrysolina brunsvicensis (GRAV., 1807)

Hn+(-): Hannover, Ahltener Wald, STEINHAUSEN, 11.IX.1952, mehrfach [coll. STEINHAUSEN, L. SCHMIDT i.l. 1999].

Chrysolina quadrigemina (SUFFR., 1851)

Ba-: Villingen, Istein, HARTMANN, ohne Datum [HARTMANN 1907].

Chrysolina analis (L., 1767)

Hn-: Eschede, 17.X.1909, 1 Ex. [coll. Mus. Hannover, L. SCHMIDT i.l. 99].

Chrysolina marginata (L., 1758)

Sd+: Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i.l. 1999].

Neophaedon pyritosus (ROSSI, 1792)

Ba-: Grenzach bei Weil a.Rh., FÖRSTER, ohne Datum, an *Ranunculus* [HARTMANN 1907].

Chrysomela collaris L., 1758

Hn-: Engelbostel, 16.VI.1924, 2 Ex. [coll. Mus. Hannover, L. SCHMIDT i.l. 99].

Phratora atrovirens (CORN., 1857)

Hs+(): Berger, Hang, Gettenbach, Hanau, Obertshausen, omnia HÖHNER leg. [HÖHNER i.l. 1998].

Galeruca interrupta ILL., 1802

Hn-: Mandelsloh, VI.1916, 3 Ex. [coll. Mus. Hannover, L. SCHMIDT i.l. 99].

Galeruca laticollis SAHLB., 1837

Hn+(-): Harz, Hohegeiß, SPRICK, 30.V.1998, mehrere Larven von *Trollius europaeus* gesammelt, zwei Wochen später 5 Imagines erhalten. [coll. SPRICK, L. SCHMIDT i.l. 1999].

Galeruca melanocephala PONZA, 1805

MV+: Dömitz, ZIEGLER, 20.VII.1996 [ZIEGLER i.l. 1999].

Luperus flavipes (L., 1767)

MV+(-): Gothmann, ZIEGLER, 6.VI.1994 [ZIEGLER i.l. 1999].

Phyllotreta christinae (HKTR., 1941)

Hs+: Rudingshain, NWR Niddahänge, FLECHTNER, 1990-92 [FLECHTNER et al. 1995].

Phyllotreta diademata FOU DR., 1860

Ba+(): Grissheim, Rheintrockenaue, NEUMANN, 28.VI.1995, 2 Ex. (t. DÖBERL.) [NEUMANN i.l. 1999].

Phyllotreta consobrina (CURT., 1837)

Ba+(-): Reichenau, HORION, IV.1953, 1 Ex. [HORION 1955b].

Phyllotreta procerca (REDT., 1849)

Wf+: Neubeckum, Steinbruch, RÖWEKAMP, 12.X.1996, 1 Ex. (t. RENNER) [RÖWEKAMP & RENNER i.l. 1998].

Aphthona abdominalis (DUFT., 1825)

Wt+: Bremelau, DOLDERER, 13.VI.1962 - Tübingen, Spitzberg, MEYER, II. und XI.1952-54, 2 Ex. aus Laubstreu [HARDE & KÖSTLIN 1965].

Longitarsus ochroleucus (MARSH., 1802)

Hn+(): Salzgitter-Thiede, Thieder Lindenberg, STEINHAUSEN, 4.IX.1952, mehrfach [coll. STEINHAUSEN, L. SCHMIDT i.l. 1999].

Longitarsus symphyti HKTR., 1912

Wt+: Tübingen, Spitzberg, MEYER, VI.-VIII.1952-54, 6 Ex. [MEYER 1966].

Longitarsus australis (MULS.REY, 1874)

Ba+(-): Kaiserstuhl, Lilienhof, MAUS, 27.IV.1985, 4 Ex. (DÖBERL det.) - Grissheim, Rheintrockenaue, NEUMANN, I. und 5.IX.1994, zahlreich [MAUS 1987, NEUMANN i.l. 1999].

Longitarsus ferrugineus (FOU DR., 1860)

St+: Stendal, NSG Bindfelde, SPRICK, 4.IX.1997, 2 Ex. an einem neu angelegtem Stillgewässer unter *Mentha arvensis* [coll. SPRICK, L. SCHMIDT i.l. 1999].

Longitarsus membranaceus (FOU DR., 1860)

Hs+(): Hanau, Kleine Bulau, HÖHNER, 22.XII.1993 aus Hochwasser-genist [HÖHNER i.l. 1998].

Longitarsus lewisii (BALY, 1874)

Ba+: Hartheim, Rheintrockenaue, BÜCHE, 15.V.1997, zahlreich [NEUMANN i.l. 1999].

Longitarsus dorsalis (F., 1781)

Sd+: Saarbrücken, Trarbacher Platz, EISINGER, 29.III.1998, 1 Ex. (KÖHLER det.) aus verrottenden Stengeln gesiebt [coll. EISINGER].

Longitarsus parvulus (PAYK., 1799)

Ba-: Neuenburg, HARTMANN, 21.V.1924 [HARTMANN 1926].

Altica brevicollis FOU DR., 1860

St+: Stendal, Springlaake, SPRICK, 4.V.1993, 10 Ex. in einem feuchten Laubwald am Waldrand von *Corylus avellana* - Seebenauer Holz, ZIEGLER, 3.VII.1993 [SCHMIDT i.l. 1999, ZIEGLER i.l. 1999].

Batophila rubi (PAYK., 1799)

MV+(-): Gothmann, ZIEGLER, 18.VIII.1994 [ZIEGLER i.l. 1999].

Ochrosia ventralis (ILL., 1807)

Hn-: Hils, ohne Datum, 2 Ex. [coll. Mus. Hannover, L. SCHMIDT i.l. 99]. **Wt+()**: Markgröningen, KÖSTLIN, 12.III.1956, 1 Ex. aus Laub-waldboden gesiebt [KÖSTLIN 1958b].

Asiolestia nigrifolia (GYLL., 1813)

Hn-: Deister, ohne Datum, 2 Ex. (t. SPRICK) [coll. Mus. Hannover, L. SCHMIDT i.l. 99].

Crepidodera aurea (FOURCR., 1785)

MV+(-): Gothmann, ZIEGLER, 18.VIII.1994 [ZIEGLER i.l. 1999].

Chaetocnema procerula (ROSH., 1856)

Br+(-): Berlin-Köpenick, Müggelsee, ESSER, 19.IV.1998, 3 Ex. in einem Erlenbruch gesiebt [ESSER 1998b].

Chaetocnema procerula (ROSH., 1856)

Wt+: Ramminger Moos, DOLDERER, 29.V.1958 [HARDE & KÖSTLIN 1965].

Chaetocnema compressa (LETZN., 1846)

MV+: Klein Schmölen, Dömitz, ZIEGLER, 8.VI.1994 [ZIEGLER i.l. 1999]. **No+**: Wesel, Diersförder Wald, SCHARF, 10.X.1995, 1 Ex. (coll. RÖWEKAMP, t. RENNER) [RÖWEKAMP & RENNER i.l. 1998].

Apteropeda splendida ALL., 1860

Hn+: Deister, Steinkrug, SPRICK, 21.V.1998, 2 Ex. (t. GÜRLICH) [coll. SPRICK, L. SCHMIDT i.l. 1999].

Apteropeda globosa (ILL., 1794)

Hn+: Diekholzen, Kalte Beuster, L. SCHMIDT, 30.V.1998, 1 Ex. [coll. L. SCHMIDT].

Mniophila muscorum (KOCH, 1803)

Pf+: Schaidt, NWR Mörderhäufel, KÖHLER, 28.IX.1997, 15 Ex. an einem bemoosten Eichenstamm [KÖHLER Bienwald].

Dibolia cynoglossi (KOCH, 1803)

Ba-: Wallhausen/Bodensee, HORION, VII.1943, 1 Ex. [HORION 1955b].

Psylliodes luteolus (MÜLL., 1776)

Ba-: Wallhausen/Bodensee, HORION, Ende VI.1943, 1 Ex. gekeschert [HORION 1955b].

Psylliodes thlaspis FOU DR., 1860

Ba-: Istein, Isteiner Klotz, HARTMANN, ohne Datum [HARTMANN 1907].

Cassida murraea L., 1767

MV+(-): Dömitz, ZIEGLER, 9.VIII.1994 [ZIEGLER i.l. 1999].

Cassida margaritacea SCHALL., 1783

St+: Athenstedt, JUNG, 1998, 1 Ex. [JUNG i.l. 1999].

Familie BRUCHIDAE

Spermophagus calystegiae LUKJ.TER-MIN., 1957

No+: Frechen, Grube Karl, KÖHLER, 10.VII.1998, 6 Ex. auf ehemali-gem Bahngelände [coll. KÖHLER].

Bruchus rufipes HBST., 1783

SH+: Beleg in coll. LOHSE aus Bad Oldesloe [ZIEGLER i.l. 1999].

Familie ANTHRIBIDAE

Tropideres dorsalis (THUNB., 1815)

Wt+: Isny, NSG Bodenmöser, BENSE, 6.1998, 1 Ex., Zucht aus Birkenästen [BENSE i.l. 1999].

Phaeochrotes cinctus (PAYK., 1800)

SH+: Dalldorf, ZIEGLER, 17.VI.1998 [ZIEGLER i.l. 1999].

Choragus sheppardi KIRBY, 1818

Ba+: Rheinmünster-Greffern, Rheinwald, REIBNITZ, 19.VI.1994, 1 Ex. [BENSE i.l. 1999]. **Br+**: Schlepzig, Unterspreewald, BENSE, 1998, 1 Ex., am Leimring [BENSE i.l. 1999].

Familie SCOLYTIDAE

Scolytus multistriatus (MARSH., 1802)

Sd+(-): St. Ingbert, Forst Lindscheid, EISINGER, 4.III.1990, 1 Ex. tot aus Ulmenrinde [EISINGER 1997].

Hylastes ater (PAYK., 1800)

Ba+: Grissheim, Rheintrockenaue, SZALLIES, 7.IV.1996, 2 Ex. (t. BENSE) [NEUMANN i.l. 1999].

Hylastes linearis ER., 1836

Ba+: Grissheim, Rheintrockenaue, GEIS, 8.V.1994, 1 Ex. (BENSE det.) [BENSE & NEUMANN i.l. 1999]. **Wt+**: Tübingen, Spitzberg, RÄHLE, 18.V.1971, 1 Ex. (BENSE vid.), über Kiefernkahtschlag fliegend [RÄHLE 1972].

Hylurgus ligniperda (F., 1792)

Sd+: Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i.l. 1999].

Hylesinus oleiperda (F., 1792)

Rh+(-): Spay, Rheinbogen, KÖHLER, 6.VI.1998, 1 Ex. im Autokescher [coll. KÖHLER]. **Sn+(-)**: Leipzig, Burgaue, BENSE, 1996, 1 Ex., aus Laubholzstäben gezogen [BENSE 1998].

Pleebobius kraatzi EICHH., 1864

Hs.: ohne Fundort (event. auch Rheinhessen?) [HORION 1951].

Xylechinus pilosus (RATZ., 1837)

Pf+: Ludwigswinkel, NWR Mummelskopf, KÖHLER, 15.V.1998, 1 Ex. in einer Fensterfalle an einer Kiefer [KÖHLER Mummelskopf].

Lymanter aceris LINDEM., 1875

St+: Seebenuer Holz, ZIEGLER, 7.VII.1993 im Autokescher [ZIEGLER i.l. 1999].

Dryocoetes hectographus RTT., 1913

Ba+: Schwarzwald, mehrere Fundorte (t. BENSE) [coll. Museum Stuttgart].

Ernoporicus caucasicus LINDEM., 1876

Ba+: Müntertal/Südschwarzwald, 450 m, BAUM, aus Lindenästen - Berghausen, BÜCHE, 25.V.1987, 1 Ex. - Untergrombach, NSG Kaiserberg, VI.91, 1 Ex. in coll. BÜCHE [BAUM 1989, BÜCHE i.l. 1999]. **Sn+(-)**: Thallwitz, Lauch, BENSE, Mitte V.1997, 6 Ex., aus Lindenästen gezogen [BENSE 1998].

Gnathotrichus materiarius (FITCH, 1855)

SH+: Düneberg bei Geesthacht, TOLASCH, 15.IV.1998 [ZIEGLER i.l. 1999].

Pityogenes bistridentatus (EICHH., 1879)

Br? (+), By? (+), Hs? (-), Sn? (+), Wt? (+): vermutlich jeweils *Pityogenes conjunctus* [BENSE i.l. 1999].

Pityogenes conjunctus (RTT., 1887)

Ba+: mehrere Fundorte im Nordschwarzwald [BENSE 1996b].

Orthotomicus proximus (EICHH., 1867)

Ba+: Hartheim, MAUS, 30.V.1981, 1 Ex. (det./coll. KAMP) - Grissheim, Rheintrockenaue, NEUMANN, 11.IX.1994, zahlreich (BENSE det.) [KAMP 1983, NEUMANN i.l. 1999]. **Hs-**: Mitteldick, EGGERS, 9.X.1901, 2 Ex. (coll. HÖHNER) [HÖHNER i.l. 1998].

Ips cembrae (HEER, 1836)

MV+: Testorfer Holz, Zarentin, ZIEGLER, 28.V.1995 [ZIEGLER i.l. 1999].

Xyleborus alni NIIJIMA, 1909

Hs+: Neuhoof, NWR Schönbuche, FLECHTNER, 1990-92 [DOROW et al. im Druck].

Xyleborus peregrinus EGGERS, 1944

Wf+: Wimbem, Voßwinkel, LÜCKMANN, 16.V.1998, 2 Ex. (KÖHLER det.) und später weitere Exemplare in einem Eichenforst [KÖHLER i.l. 1998].

Familie RHYNCHITIDAE

Auletobius sanguisorbae (SCHRK., 1798)

Wt+(-): Langenauer Moos, DOLDERER, VI.1957, 12 Ex. an *Sanguisorba* [HARDE & KÖSTLIN 1962].

Rhynchites bacchus (L., 1758)

Ne+(-): Amt Neuhaus, Stixe, ZIEGLER, 23.IV.1998 [ZIEGLER i.l. 1999].

Deporaus tristis (F., 1794)

Rh+: Taben-Rodt/Saar, Urwald von Taben, RENNER, 30.V.1997, 1 Ex. [KÖHLER Taben].

Familie APIONIDAE

Diplapion stolidum (GERM., 1817)

Sd+: Saarbrücken, Trarbacher Platz, EISINGER, 18.V.1998, 37 Ex. von Margeriten [coll. EISINGER].

Aspidapion aeneum (F., 1775)

Sd+: Saarbrücken, Trarbacher Platz, EISINGER, 25.V.1998, 10 Ex. von *Althaea rosea* [coll. EISINGER].

Squamapion vicinum (KIRBY, 1808)

Sd+: Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i.l. 1999].

Protapion varipes (GERM., 1817)

Ba+: Ebringen sw. Freiburg, MAUS, 3.V.1987 und 10.IV.1991, 2 Ex. - Badenweiler, STROHM, 6.IV.19 und 28.IX.1937 [REIBNITZ 1990, MAUS 1991].

Protapion difforme (GERM., 1818)

Ba-: Achkarren, "Faule Waag", WOLF, 9.III.1936, 1 Ex. (MAUS det.) [REIBNITZ 1990].

Mesotrichapion punctirostre (GYLL., 1839)

Wt?: Fund vor 1950 nach REIBNITZ (1990), KÖSTLIN (1973) nennt einen sehr fraglichen alten Fund aus Würtemberg [REIBNITZ 1990].

Cyanapion columbinum (GERM., 1817)

Hn+(-): Diekholzen, Bahnbrücke der ICE-Trasse, SPRICK, 19.VI.1998, 1 Ex. - Kissenbrück, Ösel, L. SCHMIDT, 3.VII.1998, 1 Ex. (t. SPRICK) [L. SCHMIDT i.l. 1999].

Oxystoma dimidiatum (DESBR., 1897)

Hs+: Rudingshain, NWR Niddahänge, FLECHTNER, 1990-92 [FLECHTNER et al. 1995].

Oxystoma pomonae (F., 1798)

Sd+: Saarbrücken, Trarbacher Platz, EISINGER, 29.VI.1998, 1 Ex. von Staude [coll. EISINGER].

Eutrichapion melancholicum (WENCK., 1864)

Wt+(-): Tübingen, Spitzberg, MEYER, VIII-IX.1952-54, 3 Ex. [MEYER 1966].

Familie CURCULIONIDAE

Otiorhynchus armadillo (ROSSI, 1792)

SH+(i): seit dem Erstnachweis mehrfach gefunden worden [ZIEGLER i.l. 1999].

Otiorhynchus arcticus (O.F., 1780)

By-: Berchtesgaden, 1909, 1 Ex. (t. BEHNE) in coll. HANE & MÜLLER, Bludenz [BRANDSTETTER & KAPP 1998].

Otiorhynchus corruptor (HOST, 1789)

Bai(+): Freiburg, Stadtgebiet, MAUS, V.1992, zahlreich in einem Gebäude (t. BRAUN) [MAUS 1998b]. **Hni**: Hannover, IVANOV, 27.IX.1975, 1 Ex. [MAUS 1998b].

Otiorhynchus crataegi GERM., 1824

Ba+: Denzlingen, BILLEN, VII.94, mehrfach (MAUS det.) [MAUS 1998c].

Otiorhynchus cribricollis GYLL., 1834

Bai: Freiburg, VII.92, 1 Ex. an einem Salatkopf [MAUS 1998c]. **Hsi**: Bad Hersfeld, FOLWACZNY, 22.III.1960, 1 Ex. (BRAUN i.l.) [MAUS 1998c].

Otiorynchus meridionalis GYLL., 1834

Bai: Freiburg, BILLEN, 9.X.1991, 2 Ex. (BRAUN det.) an Liguster [MAUS 1998c].

Simo variegatus (BOH., 1843)

Ba+: Sechs Fundorte in Südbaden, MAUS & NEUMANN, 9 Ex. meist an wärmeren Stellen [MAUS & NEUMANN i.l. 1999].

Phyllobius cinerascens (F., 1792)

Th+(+): Bleicherode, JUNG, 1975, 2 Ex. [JUNG i.l. 1999].

Omius seminulum (F., 1792)

Ba?(-): nach HORION (1951), Quelle?, ohne sicheren Beleg fraglich [MAUS i.l. 1998].

Trachyphloeus rectus THOMS., 1865

SH+: Sylt, Morsum, TOLASCH, 15.VI.1998 [ZIEGLER i.l. 1999]. **Wt**+: Oberstotzingen, DOLDERER, V.1952, 1 Ex. unter trockenem Moos [HARDE & KÖSTLIN 1962].

Polydrusus pilosus GREDL., 1866

Ne+: Thörenwald bei Sittensen, HERRMANN, 30.III.1998 [ZIEGLER i.l. 1999].

Brachysomus setiger (GYLL., 1840)

Hn+: Kissenbrück, Ösel, L. SCHMIDT, V.98, mehrfach (t. SPRICK) in Bodenfallen [coll. L. SCHMIDT].

Foucartia ptchooides (BACH, 1856)

Ba(-): nach HORION (1951), Beleg in coll. WOLF gehören zu *Foucartia squamulata* (MAUS det.) [MAUS i.l. 1998].

Strophosoma faber (HBST., 1785)

Sd+: Altforweiler, Häsfeld, EISINGER, 14.IX.1997, 1 Ex. [coll. EISINGER].

Sitona languidus GYLL., 1834

Ne+: Uelzen, Hambrock, RENNER, 19.IX.1961 [ZIEGLER i.l. 1999].

Sitona lineellus (BONSD., 1785)

SH+(+): Sylt, Morsum, TOLASCH, 30.VI.1997 [ZIEGLER i.l. 1999].

Sitona waterhousei WALT., 1846

Wt+: Mutlangen, DOLDERER, VI.1927, 1 Ex. - Oberstotzinger Ried, DOLDERER, VI.1932, 1 Ex. [HARDE & KÖSTLIN 1962].

Lixus paraplecticus (L., 1758)

Ba+: Mannheim, FÖRSTER, vor 1907 - Binningen, HARTMANN, 12.VI.1924, 1 Ex. [HARTMANN 1907, 1926].

Lixus iridis OL., 1807

Hs+(+): Lorch, HÖHNER, 16.VI.1997, 1 Ex. an Umbellifere [HÖHNER i.l. 1998].

Lixus cylindrus (F., 1781)

Ba+: Mannheim, FÖRSTER, ohne Datum - Fahrnau, Hohe Möhr bei Schopfheim/Wiesetal, ohne Datum [HARTMANN 1907].

Lixus myagri OL., 1807

SH+(+): Sterleyer Heide, ZIEGLER, 11.VI.1998 [ZIEGLER i.l. 1999].

St+(+): Wefelingen, Salzstelle, BÜCHE 8.VI.1996, 1 Ex. an *Barbarea vulgaris* - Rogätz, Kieswerk, BÜCHE, 13.VI.1998, 3 Ex. unter *Rorippa anceps* (und Larven in Wurzeln) - Stendal-Schönhausen, Elbeufer, SPRICK, 4.VI.1992, 1 Ex. im Ufersand an *Rorippa silvestris* [BÜCHE i.l. 1999, L. SCHMIDT i.l. 1999].

Lixus rubicundus ZOUBK., 1833

Ne+: Lübbow, ZIEGLER, 12.VIII.1998 [ZIEGLER i.l. 1999].

Lixus bardanae (F., 1787)

Wt+: Bissingen o.L., DOLDERER, VI.1932, 1 Ex. - Oberstotzinger Ried, DOLDERER, VI.1939, 1 Ex. [HARDE & KÖSTLIN 1962].

Lixus filiformis (F., 1781)

Hn+(+): Langelsheim, Kahnstein, SPRICK & E. PALM, 21.VI.1998, mehrfach [coll. SPRICK, L. SCHMIDT i.l. 1999].

Larinus turbinatus GYLL., 1836

SH+: Göttin, SUIKAT, 17.VI.1998 [ZIEGLER i.l. 1999].

Coniocleonus nebulosus (L., 1758)

Ba+: Schönau, Belchen, FÖRSTER, ohne Datum [HARTMANN 1907].

Chromoderus affinis (SCHRK., 1781)

Wt+: Oberstotzingen, an Trockenhang, DOLDERER, III.46, V.51 und VI.54, 7 Ex. [HARDE & KÖSTLIN 1962].

Mecaspis alternans (HBST., 1795)

Hs+: Hanau, L. NEUMANN, ca. 1910, 2 Ex. - Schlichtern, BORNHOLDT, 13.V.1987, 1 Ex. (coll. HÖHNER) [HÖHNER i.l. 1998].

Cyphocleonus dealbatus (GMEL., 1790)

Ne+: Lübbow, PALM, 5.VI.1998 [ZIEGLER i.l. 1999].

Adosomus roridus (PALL., 1781)

Ba?: fraglich [HORION 1951].

Euophryum confine (BROUN, 1881)

SH+: Kiel, KOLLIGS, 18.VIII.1996, Lichtfang [ZIEGLER i.l. 1999].

Brachytenuus porcatus (GERM., 1824)

Ba+: Karlsruhe, Hardtwald, NEUMANN, 26.VIII.1988, zahlreich (t. MAUS) - Hartheim, Rheintrockenaue, BAYER, 12.V.1997 (t. WINKELMANN) - Rheimmünster-Stollhofen, verschiedene Finder, 1994, mehrfach und LANGE, 19.V.1997 [NEUMANN i.l. 1999, REIBNITZ i.l. 1999].

Hexarthrum capitulum (WOLL., 1858)

SH+: Hamburg-Dammtor, BURGARTH, 9.VI.1995 [ZIEGLER i.l. 1999].

Bagous argillaceus GYLL., 1836

Ba+: Mannheim, Viernheim, FÖRSTER, ohne Datum [HARTMANN 1907].

Bagous subcarinatus GYLL., 1836

Wt+: Oberstotzinger Ried, DOLDERER, V.1932, 2 Ex. [HARDE & KÖSTLIN 1962].

Bagous longitarsis THOMS., 1868

Ba+: Rußheim, Altrhein, GLADITSCH & LEIST, 1970-72, mehrfach [GLADITSCH 1978].

Bagous glabriorostris (HBST., 1795)

Ba+: Mannheim, Pulverturm, FÖRSTER, ohne Datum [HARTMANN 1907].

Hydronomus alismatis (MARSH., 1802)

Ba+: Mannheim, FÖRSTER, ohne Datum [HARTMANN 1907].

Tanyshphyrus ater BLATCH., 1928

Hs+: Seligenstadt, SCRIBA, vor 1900 [DIECKMANN 1959].

Dorytomus affinis (PAYK., 1800)

WE+(+): Spiekeroog, MAUS, 22.VII.1987, 2 Ex. [MAUS in Vorber.].

Dorytomus salicis WALT., 1851

Ba+: Hotzenwald, Spielmannswies, MERTENS & NEUMANN, Datum?, 10 Ex. an *Salix aurita* [MERTENS i.l. 1999].

Dorytomus nebulosus (GYLL., 1836)

MV+: Gothmann, ZIEGLER, 18.VIII.1994 [ZIEGLER i.l. 1999].

Dorytomus salicinus (GYLL., 1827)

Ba+: Weinstetten, Rheintrockenaue, MAUS, 23.IV.1994, [NEUMANN i.l. 1999].

Dorytomus majalis (PAYK., 1792)

Ba+: Istein, Rheinaue, HARTMANN [NEUMANN i.l. 1999].

Dorytomus puberulus (BOH., 1843)

Ba+: Hartheim, Rheinaue, MAUS, 28.II.1994, 2 Ex. fliegend, C. BAYER, 12.V.1987, mehrere Ex. an Silberpappeln (1 Ex. coll. BÜCHE) - Grissheim, Rheintrockenaue, NEUMANN, I.III.1999, 2 Ex. (t. MAUS) [MAUS & MAUSER in Vorber., BÜCHE i.l. 1999].

Dorytomus dorsalis (L., 1758)

Ba+: Todtnau, Feldberg, HORION, VI.1952, 1 Ex. an *Salix caprea* [HORION 1955b].

Thryogenes festucae (HBST., 1795)

Ba+: Uhldingen/Bodensee, HORION, VI.1943, 1 Ex. an einem - Rußheim, Altrhein, GLADITSCH, 25.X.1972, 1 Ex. [HORION 1955b, GLADITSCH 1978].

Comasinus setiger (BECK, 1817)

Sd+: Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i.l. 1999].

Smicronyx reichii (GYLL., 1836)

Ba+: Grissheim, Rheintrockenaue, NEUMANN, 5.VI.1993, 1 Ex.

(MAUS det., t. BEHNE), 22.VI.1995 und VI. 96, je 1 Ex. (t. MAUS) [NEUMANN i.l. 1999].

Smicronyx nebulosus TOURN., 1874

Ba+: Kleinkems, Rheintrockenaue, BÜCHE, 3.XI.1997, 1 Ex. (WINKELMANN det.) auf einem Trockenrasen gekeschert [BÜCHE i.l. 1999].

Smicronyx jungermanniae (REICH, 1797)

Wt+: "Bodenseeufer", DOLDERER, VI.1951 [HARDE & KÖSTLIN 1962].

Tychius schneideri (HBST., 1795)

Hn+: Bad Sachsa, Neuhoof, L. SCHMIDT, 19.VI.1998, mehrfach (PALM & SPRICK det.) in einem Steinbruch [coll. L. SCHMIDT].

Tychius squamulatus GYLL., 1836

Hn+: Bad Sachsa, Neuhoof, E. PALM, 19.VI.1998, 1 Ex. in einem Steinbruch [coll. E. PALM, L. SCHMIDT i.l. 1999].

Tychius aureolus KIESW., 1851

Hn+: Bad Sachsa, Neuhoof, L. SCHMIDT, 19.VI.1998, mehrfach (SPRICK det.) in einem Steinbruch [coll. L. SCHMIDT]. **Sn+**: Leipzig, Löbzig-Dölitz, Ruine Imkere, SPRICK, 7.VII.1995, mehrfach von *Medicago sativa*, auf durchlässigem Schlackeboden [coll. SPRICK, L. SCHMIDT i.l. 1999].

Tychius crassirostris KIRSCH, 1871

Hn+: Bad Sachsa, Neuhoof, L. SCHMIDT, 19.VI.1998, mehrfach (PALM & SPRICK det.) in einem Steinbruch [coll. L. SCHMIDT].

Tychius stephensi SCHÖNH., 1836

Hn+(-): Bad Sachsa, Neuhoof, L. SCHMIDT, 19.VI.1998, mehrfach (PALM & SPRICK det.) in einem Steinbruch [coll. L. SCHMIDT].

Tychius meliloti STEPH., 1831

Sd+: Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i.l. 1999].

Sibinia sodalis GERM., 1824

Hn+: Goslar-Steinfeld, Oker, L. SCHMIDT, 02.VI.1998, 1 Ex. am Okerufer - Langelsheim, Kahnstein, L. SCHMIDT, 21.VI.1998, 2 Ex. [coll. L. SCHMIDT].

Sibinia phalerata (GYLL., 1836)

Hn+: Salzgitter-Gitter, Segelflugplatz Schäferstuhl, L. SCHMIDT, 18.V.1998, 1 Ex. (SPRICK det.) [coll. L. SCHMIDT]. **Sd+**: Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i.l. 1999]. **Wt-**: Oberstotzingen, DOLDERER, V.1932, 1 Ex. in einer Sandgrube [HARDE & KÖSTLIN 1962].

Sibinia pellucens (SCOP., 1772)

Sd+: Perl-Nennig, Kiesgruben, G. MÜLLER, 30.V.1997, 1 Ex. [KÖHLER 1998g].

Sibinia subelliptica (DESBR., 1873)

MV+(-): Klein Schmölen, Dömitz, ZIEGLER, 20.VI.1994 [ZIEGLER i.l. 1999].

Anthonomus piri KOLLAR, 1837

Wt+: Welzheim, HEILIGMANN, I.V.1958 [HARDE & KÖSTLIN 1962].

Anthonomus spilottus REDT., 1849

Wt-: Oberstotzingen, DOLDERER, V.1931, 8 Ex. - Eschachtal, DOLDERER, VI.1931, 7 Ex. [HARDE & KÖSTLIN 1962].

Curculio elephas (GYLL., 1836)

Pf(+): Falschmeldung [Ch. NEUMANN mdl. Mitt. 1998].

Pissodes validirostris (SAHLB., 1834)

MV+: Klein Schmölen, Dömitz, ZIEGLER, 20.VI.1994 [ZIEGLER i.l. 1999].

Pissodes harcyniae (HBST., 1795)

Ba+(-): Nord-Schwarzwald, Bannwälder Wilder See und Hoher Ochsenkopf, BENSE, 1995, an und in Fichtenstämmen - Hartheim, Rheintrockenaue, MATERN, I.V.1995, 1 Ex. (KÖHLER det.) [BENSE & GEIS 1998, NEUMANN i.l. 1999].

Magdalis nitidipennis (BOH., 1843)

Wt-: Oberstotzinger Ried, DOLDERER, V.1933, 9 Ex. an Schwarzpappe [HARDE & KÖSTLIN 1962].

Magdalis fuscicornis DESBR., 1870

Ba+: Grissheim, Rheintrockenaue, MAUS, 23.VI.1991 (t. BEHNE) [MAUS & MAUSER in Vorber.]. **Wt+**: Lonetal, DOLDERER, V.1934, 1 Ex. - Markgröningen, KÖSTLIN, 2.VII.1960, 2 Ex. [HARDE & KÖSTLIN 1962].

Magdalis punctulata (MULS. REY, 1859)

Wt+: Obertal, KÖSTLIN, 17.VI.1961, 1 Ex. [HARDE & KÖSTLIN 1962].

Lepyrus capucinus (SCHALL., 1783)

Ne+(-): Pevestorf, Elbe, MEYBOHM, 22.V.1998 [ZIEGLER i.l. 1999].

Hylobius transversovittatus (GOEZE, 1777)

Hn+(-): Nienburg, Prinzenwerder, HAHLBOHM, 20.IX.1998, mehrfach [coll. HAHLBOHM, L. SCHMIDT i.l. 1999].

Leiosoma kirschi GREDL., 1866

Wt/: Eberdingen, SZALLIES, 11.V.1997, 1 Ex. (SZALLIES 1998) ist Fehlbestimmung [NEUMANN mdl. Mitt. 1999].

Donus palumbarius (GERM., 1821)

Hs+: Rudingshain, NWR Niddahänge, FLECHTNER, 1990-92 [FLECHTNER et al. 1993]. **Wt+(-)**: Alpirsbach, DOLDERER, VI.1928, 1 Ex. [HARDE & KÖSTLIN 1962].

Donus tessellatus (HBST., 1795)

Hn+(-): Hildesheim, Osterberg, L. SCHMIDT, 19.VII.1998, 1 Ex. (t. SPRICK) [coll. L. SCHMIDT].

Donus tessellatus (HBST., 1795)

Hs+: Frankfurt-Höchst, BÜCKING, 4.III.1906, 2 Ex. (coll. HÖHNER) [HÖHNER i.l. 1998].

Donus tessellatus (HBST., 1795)

MV+: Gülze, ZIEGLER, 12.III.1999 [ZIEGLER i.l. 1999].

Donus tessellatus (HBST., 1795)

Wt+: Eschachtal, VI.1928 - Abtsgmünd, VI.1927 - Schnaitheim, VIII.1961, alle DOLDERER leg. [HARDE & KÖSTLIN 1962].

Hypera kunzii GERM., 1822

Ba+(-): Kaisersstuhlgebiet, WOLF leg. (HORION 1951) ist Fehlbestimmung (t. MAUS) [MAUS i.l. 1998].

Hypera pastinacae (ROSSI, 1790)

Hs+: Lorch, HÖHNER, 13.VII.1996, 1 Ex. an *Anthemis tinctoria* [HÖHNER i.l. 1998].

Hypera pastinacae (ROSSI, 1790)

Wt+: Kornwestheim, Gänsbachtal, MALZACHER, VI.1987, 1 Ex. an *Daucus carota* [MALZACHER 1990].

Hypera venusta (F., 1781)

Hn+: Bad Sachsa-Neuhoof, NSG Sachsenstein, MELBER, 28.VII.1997, 1 Ex. (t. SPRICK) [coll. L. SCHMIDT].

Coniatus wenckeri CAP., 1868

Ba+(-): Kleinkems, HARTMANN, 12.V.1894, 10 Ex. (coll. Mus. Dresden) [HARTMANN 1907, MAUS & MAUSER in Vorber.].

Gasterocercus depressirostris (F., 1792)

Hs+(-): Bürstadt bei Bensheim, REIBNITZ, 29.IV.1978, Larven in liegenden Eichenstämmen - Mörfelden, REIBNITZ, 25.VII.1980, in gefällten Eichen [REIBNITZ 1986a].

Acalles lemur (GERM., 1824)

Sd+: Nittel, Weinberglagen, STÜBEN, 29.V.1998, 15 Ex. [KÖHLER 1998g].

Baris morio (BOH., 1844)

Hs+(-): Lorch, HÖHNER, 13.VII.1996, 1 Ex. an *Reseda luteola* [HÖHNER i.l. 1998].

Baris picicornis (MARSH., 1802)

Sd+: Burbach, Alsbachschacht, EISINGER, 21.VI.1992, 1 Ex. von *Reseda spec.* [coll. EISINGER].

Baris chlorizans GERM., 1824

Sd+: Auersmacher, Saaraue, EISINGER, 19.V.1997, 1 Ex. am Saarufer [coll. EISINGER].

Coryssomerus capucinus (BECK, 1817)

Ne+(-): Schreyahn, HENGMITH, 23.V.1998 [ZIEGLER i.l. 1999]. **Sd+**:

Perl-Nennig, Kiesgruben, EISINGER, 30.V.1997, 1 Ex. [KÖHLER 1998g].
Pelenomus velaris (GYLL., 1827)
Hs+: Langenselbold, HÖHNER, 7.VII.1973, 1 Ex. an einem Tümpelufer [HÖHNER i.l. 1998].
Pelenomus quadricorniger (COLONN., 1986)
Ba-: Uhlhingen, HORION, VI.1943, gekeschert auf sumpfiger Wiese [HORION 1955b].
Neophytobius granatus (GYLL., 1836)
Wt+(-): Niederstotzingen, DOLDERER, V.1956, 3 Ex. in einer Sandgrube [HARDE & KÖSTLIN 1962].
Neophytobius quadrinodosus (GYLL., 1813)
Ba-: Fahmau bei Schopfheim/Wiesetal, HARTMANN, ohne Datum [HARTMANN 1907].
Rhinoncus inconspicuum (HBST., 1795)
Sd+: Saarbrücken, Nauwies, EISINGER, 16.VI.1996, 1 Ex. von Seggen gekeschert [coll. EISINGER].
Dripenatus nasturtii (GERM., 1824)
Hn+: Harste, WILLERS, 5.VII.1998, 1 Ex. (t. BEHNE) in einem Bach an Brunnenkresse [coll. WILLERS, L. SCHMIDT i.l. 1999].
Poophagus hopfgarteni TOURN., 1874
St+(-): Wörlitz/Elbe, LAU LSA, 1998, 1 Ex. (JUNG det.) in Bodenfallen [JUNG i.l. 1999].
Coeliodes nigratarsis HARTM., 1895
Hn+: Rodewald, HAHLBOHM, 22.IV.1984, 1 Ex. (MEYBOHM det.) [coll. HAHLBOHM, L. SCHMIDT i.l. 1999].
Ceutorhynchus erysimi (F., 1787)
Sd+: Perl-Nennig, Kiesgruben, STÜBEN, 30.V.1997, 1 Ex. [KÖHLER 1998g].
Ceutorhynchus ignitus GERM., 1824
Sd+: Saarbrücken, Trarbacher Platz, EISINGER, 29.VI.1998, 2 Ex. von Steinkraut [coll. EISINGER].
Ceutorhynchus aeneicollis GERM., 1824
Ba-: Überlingen, HORION, V.1943, 1 Ex. an *Lepidium ruderalis* [HORION 1955b].
Ceutorhynchus puncticollis BOH., 1845
Sd+: Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i.l. 1999].
Ceutorhynchus querceti (GYLL., 1813)
Ba-: Schopfheim/Wiesetal, FÖRSTER, ohne Datum [HARTMANN 1907].
Ceutorhynchus pumilio (GYLL., 1827)
Hs+: Viernheimer Heide, HÖHNER, 26.VI.1995 und 31.V.1997, 3 Ex. [HÖHNER i.l. 1998].
Ceutorhynchus pyrrhorhynchus (MARSH., 1802)
Ba+: Karlsruhe-Rintheim, BÜCHE, 6.VI.1993, 1 Ex. [BÜCHE i.l. 1999].
Sd+: Saarbrücken, Trarbacher Platz, EISINGER, 28.VI.1998, 1 Ex. von Steinkraut [coll. EISINGER].
Neoglocianus maculaalba (HBST., 1795)
Wt+(-): Meimsheim, STEINER, 11.V.1960 [HARDE & KÖSTLIN 1962].
Datonychus urticae (BOH., 1845)
Wt+: Hepsisau, KÖSTLIN, 26.V.1958, 1 Ex. [HARDE & KÖSTLIN 1962].
Mogulones abbreviatus (F., 1792)
SH+(-): Boberg, SUKAT, 19.V.1998 [ZIEGLER i.l. 1999].
Mogulones raphani (F., 1792)
Sd+: St. Ingbert, Forst Lindscheid, EISINGER, 6.VI.1982, 1 Ex. (KÖHLER det.) [coll. EISINGER].
Mogulones geographicus (GOEZE, 1777)
Sd+: Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i.l. 1999].
Sirocalodes quercicola (PAYK., 1792)
Ba-: Mannheim, FÖRSTER, ohne Datum [HARTMANN 1907].
Trichosirocalus barnevillei (GRÉN., 1866)
Wt+: Tübingen, Spitzberg, MEYER, VI.1952-54, 1 Ex. an *Cirsium* [MEYER 1966].

Stenocarus cardui (HBST., 1784)

Ba-: Neuenburg bei Müllheim, HARTMANN, 7.VI.1922 [HARTMANN 1924].

Mecinus collaris GERM., 1821

Wt+: Markgröningen, KÖSTLIN, 6.VII.1958, 1 Ex. - Sersheim, KÖSTLIN, 20.IV.-2.V.1962 [HARDE & KÖSTLIN 1965].

Gymnetron rostellum (HBST., 1795)

Ne+: Putensen, MEYBOHM, 10.I.1998 [ZIEGLER i.l. 1999].

Gymnetron asellus (GRAV., 1807)

Hn+: Hannover-Herrenhausen, Universitätsgelände, L. SCHMIDT, 16.VII.1998, 1 Ex. (t. SPRICK) [coll. L. SCHMIDT].

Gymnetron hispidum BRULLÉ, 1832

Wt+: Rammingen, DOLDERER, IX.1943, 1 Ex. auf *Linaria* in einer Sandgrube - Indelhausen, DOLDERER, VI.1962, 1 Ex. [HARDE & KÖSTLIN 1962].

Gymnetron netum (GERM., 1821)

Hn+: Braunlage, Warme Bode, L. SCHMIDT, 22.VII.1997, 1 Ex. (t. SPRICK) [coll. L. SCHMIDT].

Gymnetron bipustulatum (ROSSI, 1792)

Sd+: Funddaten unbekannt [coll. MOSBACHER, EISINGER i.l. 1999].

Miarus ajugae (HBST., 1795)

Sn+: Zwota, Klingental, RENNER, 24.V.1998, 2 Ex. auf einer Waldwiese [RENNER i.l. 1999].

Cionus olivieri ROSENSCH., 1838

Ba+: Singen, Hohentwiel, HORION, mehrfach [HARDE & KÖSTLIN 1962]. **Wt+(-)**: "Bodenseeufer", VI.1951, DOLDERER [HARDE & KÖSTLIN 1962].

Cionus nigratarsis RTT., 1904

Hs+: Odenwald, VOGT, 21.VIII.1956 (coll. HÖHNER) [HÖHNER i.l. 1998].

Cleopus solani (F., 1792)

Hn+(-): Nienburg, Prinzenwerder, HAHLBOHM, 20.IX.1998, mehrfach [coll. HAHLBOHM, L. SCHMIDT i.l. 1999].

Pseudorchestes pratensis (GERM., 1821)

Wt?: Tübingen, Spitzberg, MEYER, VII.1952, 1 Ex. (Bestimmung unsicher) [MEYER 1966, MAUS i.l. 1999].

Tachyerges pseudostigma (TEMP., 1982)

Ba+: Griflheim, Rheinaue, NEUMANN, V.1993, 1 Ex. - Greffern, GLADITSCH, 18.VI.1994 [MAUS & MAUSER in Vorber.].

6. Literatur

- ASSING, V. (1998a): A Revision of the Palaearctic Species of *Zoosetha* MULSANT & REY and *Poromniusa* GANGLBAUER (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). - Mitt. Mus. Nat.kd. Berlin, Dtsch. ent. Z. (Berlin) **45**, 73-94.
- ASSING, V. (1998b): *Gyropaena transversalis* STRAND im südlichen Niedersachsen (Staphylinidae). - Ent. Bl. (Krefeld) **94**, 142.
- BAUM, F. (1989): Zur Käferfauna des Belchegebietes, in: Der Belchen - Geschichtlich-naturkundliche Monographie des schönsten Schwarzwaldberges. Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs **13**. Karlsruhe, 965-1030.
- BAUMANN, H. (1997): Die Bockkäfer (Coleoptera, Cerambycidae) des nördlichen Rheinlandes. - Decheniana-Beihefte (Bonn) **36**, 13-140.
- BEIER, W. (1998): Erstnachweis des Marienkäfers *Hippodamia undecimnotata* (SCHNEIDER, 1792) (Col., Coccinellidae) für das Land Brandenburg. - Ent. Nachr. Ber. (Dresden) **42**, 242-243.
- BENSE, U. & K.-U. GEIS (1998): III. Holzkäfer, in: BÜCKING, W. (Hrsg.): Faunistische Untersuchungen in Bannwäldern. - Mitt. Forstl. Vers.-Forsch.anst. Bad.-Württ. (Freiburg) **203**, 45-117.
- BENSE, U. (1996b): *Pityogenes conjunctus* (RTT.) im Schwarzwald und in Oberschwaben (Col., Scolytidae). Kleine Mitteilung 177. - Mitt. ent. Ver. Stuttgart **31**, 111.
- BENSE, U. (1998): Ein Beitrag zur Holzkäferfauna von Nordwest-

- Sachsen. - Veröff. Naturkundemuseum Leipzig (Leipzig) **16**, 56-84.
- BESUCHET, Cl. & A. SUNDT (1971): 21. Familie: Ptiliidae, in: Freude, H., K. W. Harde & G. A. Lohse (Hrsg.): Die Käfer Mitteleuropas, Band 3. - Krefeld, 311-342.
- BETTAG, E., M. NIEHUIS, R. SCHIMMEL & W. VOGT (1980): Bemerkenswerte Käferfunde in der Pfalz und benachbarten Gebieten. 5. Beitrag zur Kenntnis der Käfer der Pfalz. - Pfälzer Heimat **31**, 2-8.
- BRANDSTETTER, C. & A. KAPP (1998): Ein Altfund von *Otiorhynchus arcticus* (F.) - neu für Deutschland (Curculionidae). - Ent. Bl. (Krefeld) **94**, 114.
- BRECHTEL, F. & H. U. KOSTENBADER (im Druck): Die Pracht- und Hirschkäfer Baden-Württembergs.
- BRITZ, R. & D. BERNHARD (1994): Ein Beitrag zur Holzkäferfauna des Landschaftsschutzgebietes Rammert bei Tübingen. Veröff. Naturschutz u. Landespflege Bad.-Württ. **68/69**, 339-353.
- BRITZ, R. (1990): Bemerkenswerte Käferfunde aus dem Kreis Tübingen. - Mitt. ent. Ver. Stuttgart (Stuttgart) **25**, 66-72.
- BÜCHE, B. (1998): *Gastrallus knizeki* ZAHRADNIK 1996, eine für Deutschland neue Art (Coleoptera: Anobiidae). - Mitt. ent. Ver. Stuttgart (Stuttgart) **33**, 74-76.
- BÜCKING, H. (1930-1932): Die Käfer von Nassau und Frankfurt. Erster Nachtrag zur 2. Auflage des Hauptverzeichnisses von Lucas von HEYDEN. - Ent. Bl. (Berlin) **26**, 145-163, **27**, 39-42, 83-89, 122-128, 174-183, **28**, 73-80, 122-125, 167-170.
- CUPPEN, J., VORST, O. & R. BELLSTEDT (1998): Five beetles new for Thuringia, and records of endangered water beetles (Coleoptera: Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Staphylinidae). - Thür. Faun. Abh. (Gotha) **5**, 169-178.
- DIECKMANN, L. (1959): Die mitteleuropäischen Arten der Gattung *Tanysphyrus* SCHÖNHERR. - Ent. Bl. (Krefeld) **55**, 16-24.
- DOROW, W. H. O., G. FLECHTNER & J.-P. KOPELKE (im Druck): Naturwaldreservate in Hessen No. 6/2. Schönbusche, Zoologische Untersuchungen. - Mitt. Hess. Landesforstverw.
- EISINGER, D. (1997): Die Käferfauna (Coleoptera) von Forst Lindscheid bei St. Ingbert im Saarland. - Decheniana-Beihefte (Bonn) **36**, 141-184.
- ERBELING, L. (1997): Erstmeldung von *Saprinus georgicus* MARSEUL, 1862 für Deutschland (Col., Histeridae). - Ent. Nachr. Ber. (Dresden) **41**, 148.
- ERBER, D. (1983): Faunistik der hessischen Koleopteren. Elfter Beitrag: Familie Chrysomelidae, I. Unterfamilie Clytrinae. - Mitt. Int. Ent. Ver. (Frankfurt) **7**, 70-100.
- ERMISCH, K. (1967): Neue *Mordellistena*-Arten aus Mitteleuropa und der Balkanhalbinsel. - Ent. Bl. (Krefeld) **63**, 110-119.
- ERPELDING, A. (1998): Faunistisch-ökologische Charakterisierung ausgewählter Auwald-Stillgewässer an der unteren Kinzig (Hessen), dargestellt anhand der Wasserkäferfauna. Diplomarbeit.
- ESSER, J. (1998a): Interessante Käferfunde aus Deutschland (Col.). - Ent. Nachr. Ber. (Dresden) **42**, 95-97.
- ESSER, J. (1998b): Neue Käferfunde aus Berlin (Col.). - Ent. Nachr. Ber. (Dresden) **42**, 241-242.
- FLECHTNER, G. (1984): Der Eich-Gimbsheimer Altrhein. Linnische Lebensräume und Lebensgemeinschaften. Untersuchung im Rahmen der Biotop-Kartierung, 2. Stufe Intensivkartierung (1983/1984). - Gutachten Landesamt für Umweltschutz Rheinland-Pfalz (Oppenheim).
- FLECHTNER, G., W. DOROW & J.-P. KOPELKE (1995): Die Fauna des Naturwaldreservates "Niddahänge östlich Rudingshain" (Hoher Vogelsberg), in: Stiftung hessischer Naturschutz (Hrsg.): Wieviel Urwald braucht unser Land, 11-26. - Wiesbaden.
- FLECHTNER, G., W. H. O. DOROW & J.-P. KOPELKE (1999): Naturwaldreservate in Hessen No. 5/2. Niddahänge östlich Rudingshain, Zoologische Untersuchungen. - Mitt. Hess. Landesforstverw. **32**, im Druck.
- FRANCK, P. (1933): Zur Käferfauna des Meißner. - Entomol. Bl. **29**, 150-155.
- GAUSS, R. (1963): Bemerkenswerte badische Käferfunde. - Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N.F. **8**, 439-443.
- GEIS, K.-U. & M. TRÖGER (1997): *Platydema dejeani* CAST. (Col., Tenebrionidae) an der Mittelelbe. - Ent. Nachr. Ber. (Dresden) **41**, 182.
- GLADITSCH, S. (1978): Zur Käferfauna des Rußheimer Altrheingebiets (Elisabethenwörth), in: Der Rußheimer Altrhein, eine nordbadische Auenlandschaft. Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs **10**. Karlsruhe, 451-522.
- HARDE, K. W. & R. KÖSTLIN (1962): Beiträge zur württembergischen Käferfauna II. - Jh. vaterl. Ver. Naturkunde **117**, 299-313.
- HARDE, K.W. & R. KÖSTLIN (1965): Beiträge zur württembergischen Käferfauna III. Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württemberg **120**, 247-267.
- HARTMANN, F. (1907): Beiträge zu Badens Käferfauna. Mitt. Bad. zool. Ver. **18**, 152-198.
- HARTMANN, F. (1911): Beiträge zu Badens Käferfauna II. - Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz **251-253**, 1-16, 30-38.
- HARTMANN, F. (1924): Beiträge zu Badens Käferfauna III. Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N.F. **2**, 41-56.
- HARTMANN, F. (1926): Beiträge zu Badens Käferfauna IV. Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N.F. **1**, 274-284.
- HEBAUER, F. (1994): Katalog der bayerischen Wasserkäfer. - Ber. ANL (Laufen/Salzach) **18**, 47-59.
- HEBAUER, F. (1997): *Cerych* (s. str.) *renneri* sp. n. - eine deutsche Art? (Coleoptera: Hydrophilidae). - Acta Coleopterologica (München) **13**, 73-74.
- HEMMANN, K. (1979): Käferfunde aus Südwest-Deutschland. Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N.F. **12**, 107-108.
- HENZE, W. (1996): *Bidessus minutissimus* (GERM.) - Fund in Oberschwaben (Col., Dytiscidae). Kleine Mitteilung 168. - Mitt. ent. Ver. Stuttgart (Stuttgart) **31**, 104.
- HEYDEN, L. v. (1904): Die Käfer von Nassau und Frankfurt. Frankfurt/M.
- HILLESHEIM-KIMMEL, U., H. KARAFIAT, K. LEWEJOHANN & W. LOBIN (1978): Die Naturschutzgebiete in Hessen. 2. Aufl. - Schr. Inst. Naturschutz (Darmstadt) **11**.
- HINTERSEHER, W. (1979): Faunistische Mitteilungen über einige in Deutschland seltene Käferarten, vorwiegend aus Hessen. - Ent. Bl. (Krefeld) **74**, 180-181.
- HORION, A. (1951): Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei) mit kurzen faunistischen Angaben, 2 Bde. - Kernen, Stuttgart.
- HORION, A. (1951b): Beiträge zur Kenntnis der Käfer-Fauna des Feldbergegebietes I. Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N.F. **5**, 196-212.
- HORION, A. (1953): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd.III: Malacodermata, Sternoxia (Elateridae bis Throscidae). München.
- HORION, A. (1954): Beiträge zur Kenntnis der Käfer-Fauna des Feldbergegebietes II. Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N.F. **6**, 92-109.
- HORION, A. (1954b): Beitrag zur Käfer-Fauna des badischen Bodenseegebietes. 1. Abteilung. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl. **13**, 51-61.
- HORION, A. (1955b): Beitrag zur Käfer-Fauna des badischen Bodenseegebietes. 2. Abteilung. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl. **14**, 57-69.
- HORION, A. (1956): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd.V: Heteromera, Tutzing.
- HORION, A. (1958): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd.VI:

- Lamellicornia. Überlingen.
- HORION, A. (1959): Bemerkungen zur Faunistik der württembergischen Käfer. I. Carabidae. - Jh. Ver. vaterl. Naturk. Württemberg **114**, 177-190.
- HORION, A. (1960): Bemerkungen zur Faunistik der württembergischen Käfer. II. Haliplidae bis Scaphidiidae Jh. Ver. vaterl. Naturk. Württemberg **115**, 316-329.
- HORION, A. (1960b): Koleopterologische Neumeldungen für Deutschland. 4. Reihe. - Mitt. Münch. Ent. Ges. 50, 119-162.
- HORION, A. (1961): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer VIII. - Clavicornia, 2. Teil. (Thorictidae-Cisidae), Terebrida, Coccinellidae. - Überlingen.
- HORION, A. (1961b): Bemerkungen zur Faunistik der württembergischen Käfer. III. Staphylinidae - 1. Teil. - Jh. Ver. vaterl. Nat.kd. Württemberg (Stuttgart) **116**, 238-265.
- HORION, A. (1963): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd.IX: Staphylinidae, 1. Teil Micropeplinae bis Euaesthetinae. Überlingen/Bodensee.
- HORION, A. (1965): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd.X: Staphylinidae, 2. Teil Paederinae bis Staphylininae. Überlingen/Bodensee.
- HORION, A. (1967): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer., Bd.XI: Staphylinidae, 3. Teil Habrocerinae bis Aleocharinae (ohne Subtribus Athetae). Überlingen/Bodensee.
- HORION, A. (1974): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd.XII: Cerambycidae - Bockkäfer. Überlingen-Bodensee.
- HORION, A. (1975): Nachtrag zur Faunistik der mitteleuropäischen Cerambyciden (Col.). - Nachr.bl. Bayer. Ent. (München) **24**, 97-115.
- IPSEN, A. & T. Tolasch (1997): *Choleva septentrionalis sokolowskii* n. spp., eine neue cavernicole Unterart von *Choleva septentrionis* Jannel aus Mitteleuropa (Col., Cholevidae). - Ent. Nachr. Ber. (Dresden) **41**, 167-171.
- JUNG, M. (1998): Blattkäferfunde aus Sachsen-Anhalt und dem Harz (Col., Chrysomelidae). - Ent. Nachr. Ber. (Dresden) **42**, 85-86.
- KAMP, H. J. (1983): Bemerkenswerte Borkenkäferfunde aus Baden-Württemberg. Mitt. ent. Ver. Stuttgart **18**, 53-58.
- KAMP, H.J. (1978): Zur Insekten-Faunistik Südwestdeutschlands. Coleoptera: Scolytidae und Platypodidae (1. Nachtrag). Mitt. ent. Ver. Stuttgart **13**, 1-8.
- KELLER, # (1864): Verzeichnis der bisher in Württemberg aufgefundenen Coleopteren. - Württ. nat.wiss. Jh. **1864**, 213-305.
- KLESS, J. (1959): Bemerkenswerte Käferarten aus der Wutachschlucht. Mitt.Bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N.F. **7**, 357-362.
- KLESS, J. (1998): Käfer aus dem NSG Unterhölzer Wald auf der Baar. Ergebnisse der Exkursion 1992 der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen. - Mitt. ent. Ver. Stuttgart (Stuttgart) **33**, 81-95.
- KNAPP, H. (1998): *Uloma culinaris* (L.) - Neu für Baden-Württemberg (Col., Tenebrionidae). - Mitt. ent. Ver. Stuttgart (Stuttgart) **33**, 79-80.
- KOCH, K. (1978): Zweiter Nachtrag zur Käferfauna der Rheinprovinz. - Decheniana (Bonn) **131**, 228-261.
- KOCH, K. (1990): Dritter Nachtrag zur Käferfauna der Rheinprovinz. Teil I: Carabidae - Scaphidiidae. - Decheniana (Bonn) **143**, 307-339.
- KOCH, K. (1993): Dritter Nachtrag zur Käferfauna der Rheinprovinz. Teil III: Ostromiidae bis Platypodidae. - Decheniana (Bonn) **146**, 203-271.
- KÖHLER, F. (1996a): Käferfauna in Naturwaldzellen und Wirtschaftswald. Vergleichsuntersuchungen im Waldreservat Kermeter in der Nordeifel. - Schriftenr. LÖBF/LafAO NRW (Recklinghausen) **6**, 1-283.
- KÖHLER, F. (1996g): Zur Käferfauna (Col.) des unteren Saartales und des westlichen Mosel-Saar-Raumes. - Mitt. Arb.gem. Rhein. Koleopterologen (Bonn) **6**, 217-246.
- KÖHLER, F. (1997d): Anmerkungen zur Käferfauna der Rheinprovinz XI. - Mitt. Arb.gem. Rhein. Koleopterologen (Bonn) **7**, 29-51.
- KÖHLER, F. (1998e): Anmerkungen zur Käferfauna der Rheinprovinz XII. - Mitt. Arb.gem. Rhein. Koleopterologen (Bonn) **8**, 35-51.
- KÖHLER, F. (1998f): Vergleichende Untersuchungen zur Totholz Käferfauna (Coleoptera) des Naturwaldreservates "Himbeerberg" im Hunsrück. - Mainzer naturw. Archiv (Mainz) **36**, im Druck.
- KÖHLER, F. (Bienenwald): Bestandserhebungen zur Totholz Käferfauna in den Naturwaldreservaten Stuttperch" (Forstamt Schaidt) und "Mörderhäufel" (Forstamt Hagenbach) im Bienenwald. In Vorbereitung.
- KÖHLER, F. (Mummelskopf): Die Totholz Käferfauna (Col.) des Naturwaldreservates "Mummelskopf" im südlichen Pfälzer Wald, in Vorber.
- KÖHLER, F. (Oberpfalz): Die Totholz Käferfauna (Col.) der oberpfälzer Naturwaldreservate "Gitschger" und "Schwarzwührberg", in Vorber.
- KÖHLER, F. (Ochsenberg): Die Totholz Käferfauna (Coleoptera) der Naturwaldzelle Ochsenberg. Unpubl. Gutachten (LÖBF/LafAO Recklinghausen), LÖBF-Schrr. im Druck.
- KÖHLER, F. (Stelzenbach): Die Totholz Käferfauna (Col.) des Naturwaldreservates Stelzenbach und eines angrenzenden Wirtschaftswaldes im Westerwald, in Vorber.
- KÖHLER, F. (Taben): Untersuchungen zur Käferfauna des Naturwaldreservates "Urwald von Taben" und angrenzender Bereiche bei Taben-Rodt/Saar. In Vorber.
- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (Hrsg.) (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. - Ent. Nachr. Ber. (Dresden) Beiheft **4**, 1-185.
- KÖLLNER, T. & P. Haase (1997): Über einige seltene Wasserinsekten des Westharzes. - Göttinger naturkundl. Schr. (Göttingen) **4**, 173-179.
- KÖSTLIN, R. (1957): Weitere bemerkenswerte Käferfunde in Württemberg. - Jh. vaterl. Ver. Naturkunde **112**, 325-328.
- KÖSTLIN, R. (1958b): Weitere bemerkenswerte Käferfunde in Württemberg. - Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württemberg **113**, 324-327.
- KÖSTLIN, R. (1973): Beiträge zur Insekten-Faunistik Südwestdeutschlands. Die Gattung Apion. - Mitt. Ent. Ver. Stuttgart (Stuttgart) **8** (Sonderheft 12), 1-198.
- KRELL F. T. (1993): Die Lamellicornia der Käfersammlung Paul Dolderer, Heidenheim. - Mitt. Ent. Ver. Stuttgart (Stuttgart) **28**, 34.
- KRELL, F.-Th. & H. FERY (1992): Familienreihe Lamellicornia, in Lohse, G. A. & W. Lucht (Hrsg.): Die Käfer Mitteleuropas. Zweiter Supplementband mit Katalogteil (Band 13). - Krefeld, 200-252.
- LAUTERBORN, R. (1926): Faunistische Beobachtungen aus dem Gebiet des Oberrheins und des Bodensees. 6. Reihe. Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N.F. **2**, 3-12.
- LILLIG, M. (1998): *Amara anthobia* A. & J. B. VILLA, 1833 - eine für das Saarland neue Laufkäferart (Coleoptera: Carabidae). - Delattinia (Saarbrücken) **30**, 578-579.
- LUCHT, W. & KLAUSNITZER, B. (Hrsg.) (1998): Die Käfer Mitteleuropas. Vierter Supplementband (Bd. 15). - Jena.
- LUCHT, W. (1981b): Coleoptera Westfalica: Familia Trogositidae. - Abh. Landesmus. Nat.kd. Münster (Münster) **43**, 35-42.
- LÜCKMANN, J. (1998): Bemerkenswerte Nachweise von zwei Schwarzkäferarten im NSG Mahlpfuhler Fenn (Col., Tenebrionidae). - Ent. Nachr. Ber. (Dresden) **42**, 239-240.
- MALZACHER, P. (1990): Zur Käferfauna gehölzdominierter Strukturelemente der Gemarkungen Ludwigsburg, Kornwestheim und Kortal-Münchingen. - Mitt. ent. Ver. Stuttgart **25**, 122-141.
- MARTEN, M. (1983): Die Ephemopteren, Plecopteren, Heteropteren

- und Coleopteren der Fulda. Diplomarbeit, Berlin.
- MAUS, Ch. & J. MAUSER (in Vorber.): Die phytophagen Käfer (Coleoptera: Chrysomelidae, Curculionidae s.l.) der Trockenauegebiete am südbadischen Oberrhein.
- MAUS, Ch. (1983): Beiträge zur Käferfauna Spiekerroogs/I. Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N.F. **13**, 245-254.
- MAUS, Ch. (1986): Beiträge zur Käferfauna Spiekerroogs/II. Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N.F. **14**, 127-145.
- MAUS, Ch. (1987): Zweiter Beitrag zur Käferfauna Südwestdeutschlands. Mitt. ent. Ver. Stuttgart **22**, 5-28.
- MAUS, Ch. (1988): Beiträge zur Käferfauna Spiekerroogs/III. - Mitteil. bad. Landesver. Naturk. Natursch. (Freiburg) **14**, 661-680.
- MAUS, Ch. (1991): Die Apioniden (Coleoptera) der Sammlungen des Museums für Naturkunde in Freiburg. Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N.F. **15**, 439-445.
- MAUS, Ch. (1996): Taxonomische und phylogenetisch-systematische Untersuchungen zur Untergattung *Coprochara* MULSANT & REY, 1874 der Gattung *Aleochara* GRAVENHORST, 1802 (Coleoptera, Staphylinidae). Diplomarbeit, Universität Freiburg.
- MAUS, Ch. (1998): Bemerkenswerte *Otiorhynchus*-Funde aus Südwestdeutschland (Coleoptera: Curculionidae). - Mitt. ent. Ver. Stuttgart (Stuttgart) **33**, 60-64.
- MAUS, Ch. (1998a): Taxonomical contributions to the subgenus *Coprochara* MULSANT & REY, 1874 of the genus *Aleochara* GRAVENHORST, 1802 (Coleoptera: Staphylinidae). Kol. Rundschau (Wien) **68**, 81-100.
- MAUS, Ch. (1998b): Bemerkenswerte *Otiorhynchus*-Funde aus Südwestdeutschland. Mitt. ent. Ver. Stuttgart **33**, 60-64.
- MAUS, Ch. (in Vorber.): Beiträge zur Käferfauna Spiekerroogs IV.
- MEYER, K.H. (1966): Die Käfer des Spitzbergs. In: Der Spitzberg bei Tübingen. - Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden- Württembergs. Landesstelle für Naturschutz und Landschaftspflege, Ludwigsburg, 855-930.
- MOLEND, R. (1996): Zoogeographische Bedeutung Kaltluft erzeugender Blockhalden im außeralpinen Mitteleuropa: Untersuchungen an Arthropoda, insbesondere Coleoptera. Verh. naturwiss. Ver. Hamburg. N.F. **35**, 5-93.
- MÜLLER, A. & K. REISSMANN (1998): *Hypocaccus rugiceps* (DUFT., 1805) - Wiederfund für die Rheinprovinz mit allgemeinen Anmerkungen zur Gattung *Hypocaccus* (Thoms.) (Col., Histeridae). - Mitt. Arb.gem. Rhein. Koleopterologen (Bonn) **8**, 121-123.
- NEUMANN, Ch. & B. BÜCHE (1998): *Dorcatoma minor* ZAHRADNIK 1993 (Coleoptera: Anobiidae) - Anmerkungen zur Bestimmung, Verbreitung und Biologie auch der verwandten Arten. - Mitt. ent. Ver. Stuttgart (Stuttgart) **33**, 67-71.
- NIEHUIS, M. & U. BRENNER (1998): *Anthaxia millefolii polychloros* AB. - Wiederfunde am Mittelrhein. - Mitt. Arb.gem. Rhein. Koleopterologen (Bonn) **8**, 101-107.
- NIEHUIS, M. (1997): Der Prachtkäfer *Agrilus ribesii* SCHAEFER, 1946 (Coleoptera: Buprestidae) neu in der Rheinprovinz und in Rheinland-Pfalz. - Mitt. Arb.gem. Rhein. Koleopterologen (Bonn) **7**, 67-71.
- NOLTE, O. (1995): *Cardiophorus asellus* ER. und *Dicronychus equisetoides* LOHSE, zwei interessante Elateriden in Südhessen (Col., Elateridae). Kleine Mitteilung 165. - Mitt. ent. Ver. Stuttgart **30**, 24.
- NOLTE, O., G. GEGINAT & H. WEIHRACH (1997): Erfassung xylobionter Käfer (Coleoptera) des Lampertheimer Waldes (Südhessen), ein Zwischenbericht. - Hess. faun. Briefe (Darmstadt) **16**, 33-48.
- NOWOTNY, H. (1951): Beobachtungen über die Insektenwelt des Naturdenkmals Stutensee. - Carolea **10**, 46-56.
- OSTEN, T. (1992): *Velleius dilatatus* F. (Col., Staphylinidae) zu Gast im Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart. Kleine Mitt. 130. - Mitt. ent. Ver. Stuttgart (Stuttgart) **27**, 6.
- PATTRI, H. O. E. (1936): Sind Hymenopteren und Orthopteren an bestimmte geologische Formationen gebunden? - Ber. oberhess. Ges. Natur- u. Heilkunde N.F. **17**, 109-113.
- PAULUS, H. F. (1973): Daten zur Cerambycidenfauna der näheren und weiteren Umgebung von Mainz (Insecta, Coleoptera). - Entomologische Zeitschrift (Frankfurt) **83**, 233-247.
- PERSOHN, M. & P. BÜNGENER (1989b): Neue und wiederentdeckte Käfer in der Pfalz (Insecta: Coleoptera). 2. Teil. - Pfälzer Heimat **40**, 130-136.
- PESCHKE, K. & D. FULDNER (1977): Übersicht und neue Untersuchungen zur Lebensweise der parasitoiden Aleochariden. Zool. Jahrb. Syst. **104**, 242-262.
- PÜTZ, A. & P. SPRICK (1996): Zwei neue Nachweise von *Curimopsis monticola* (FRANZ, 1967) und *Curimopsis paleata* (ERICHSON, 1846) aus Sachsen-Anhalt (Col., Byrrhidae: Syncalypinae). - Ent. Nachr. Ber. (Dresden) **40**, 256-258.
- PÜTZ, A. (1984b): *Cryptopleurum subtile* (SHARP) in der Umgebung von Eisenhüttenstadt (Col., Hydrophilidae). - Ent. Nachr. Ber. (Dresden) **28**, 225.
- PÜTZ, A. (1989a): *Euplectus bonvouloiri narentinus* REITTER, 1881, neu für die Fauna der DDR (Coleoptera, Pselaphidae). - Ent. Nachr. Ber. (Dresden) **33**, 93-94.
- PÜTZ, A. (1998): 47. Familie: Byrrhidae, in: LUCHT, W. & B. KLAUSNITZER (Hrsg.): Die Käfer Mitteleuropas. Vierter Supplementband (Bd. 15). - Jena.
- RÄHLE, W. (1972): Ein Nachtrag zur Käferfauna des Spitzbergs bei Tübingen. - Veröff. Landesanst. Natursch. Landschaftspflege (Ludwigsburg) **40**, 129-138.
- REIBNITZ, J. (1986a): *Gasterocercus depressirostris* F. (Curculionidae). Kleine Mitteilung 77. - Mitt. ent. Ver. Stuttgart **21**, 47.
- REIBNITZ, J. (1986b): *Triplax lepida* Fald. (Erotylidae). Kleine Mitteilung 76. - Mitt. ent. Ver. Stuttgart **21**, 46-47.
- REIBNITZ, J. (1990): Verzeichnis der Käfer von Baden-Württemberg (2): Curculionidae 1, Apioninae. Mitt. ent. Ver. Stuttgart **25**, 111-116.
- REIBNITZ, J. (1992): Verzeichnis der Käfer von Baden-Württemberg (3): Melandryidae und Tetratomidae. - Mitt. ent. Ver. Stuttgart **27**, 13-25.
- REIBNITZ, J. (1996): *Abdera quadrifasciata* (Curt.) - Fund in Luxemburg, Bayern und Hessen (Col., Melandryidae). Kleine Mitteilung 175. - Mitt. ent. Ver. Stuttgart **31**, 110.
- REIBNITZ, J. (1998): *Xylographus bostrychoides* (DUF.) - Neu für Deutschland (Col., Cisidae). Mitt. ent. Ver. Stuttgart (Stuttgart) **33**, 131.
- RENNER, K. (1998): Ein *Clambus* von der Südhalbkugel als neue Adventivart in Deutschland (Coleoptera, Clambidae). - Mitt. Arb.gem. Rhein. Koleopterologen (Bonn) **8**, 124.
- ROETTGEN, C. (1911): Die Käfer der Rheinprovinz - Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins Bonn **68**, 1-345.
- ROPPEL, J. (1990): Einige bemerkenswerte Käfer aus dem Schwarzwald (Wutachtal, Unterhölzer Wald). Mitt. ent. Ver. Stuttgart **25**, 19-23.
- ROPPEL, J. (1998): *Parmena balteatus* L. (Col., Cerambycidae) - Erstfund für Deutschland in Freiburg i. Br. - Mitt. ent. Ver. Stuttgart (Stuttgart) **33**, 59.
- RÖSSNER, E. (1995): Verbreitung der Gattung *Omaloplia* SCHÖNHERR, 1817 in der Bundesrepublik Deutschland (Col., Melolonthidae, Sericinae). - Ent. Nachr. Ber. (Dresden) **39**, 213-217.
- SCHAFFRATH, U. (1994): Beitrag zur Kenntnis der Blatthorn- und Hirschkäfer (Col. : Trogidae, Geotrupidae, Scarabaeidae, Lucanidae) in Nordhessen. - Philippia **7**, 1-60.
- SCHILLER, W. (1979): Neue Käferfunde aus Südbaden. - Mitt. Ent.

- Ges. Basel (Basel) N.F. **29**, 68-75.
- SCHILLER, W. (1979b): Die Käferfauna von Grenzach-Wyhlen. In: Der Buchswald bei Grenzach (Grenzacher Horn). - Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs **9**, 361-387.
- SCHILLER, W. (1989): Die Staphylinidae (Kurzflügler) des Belchengebietes im Südschwarzwald, in: Der Belchen - Geschichtlich-naturkundliche Monographie des schönsten Schwarzwaldberges. Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs **13**, Karlsruhe.
- SCHMID, G. (1965): Bemerkenswerte Käfer und Wanzen aus Baden-Württemberg. - Veröff. Landesstelle Naturschutz u. Landschaftspflege Bad.-Württ. **33**, 248-256.
- SCHÜLE, P. & M. PERSOHN (1997): Anmerkungen zum Vorkommen und zur Verbreitung einiger Laufkäferarten (Coleoptera, Carabidae) in Rheinland-Pfalz und dem nördlichen Rheinland, Teil I. - Mitt. Arb.gem. Rhein. Koleopterologen (Bonn) **7**, 13-25.
- SCHÜLKE, M. (1998a): Zur Identität einiger westpaläarktischer Arten der Gattung *Thinobius* KIESENWETTER, 1844 (Col., Staphylinidae, Oxytelinae). - Ent. Nachr. Ber. (Dresden) **42**, 127-138.
- SCHÜLKE, M. (1998b): *Medon rufiventris* (NORDMANN) in Sachsen-Anhalt (Staph.). - Ent. Bl. (Jena) **94**, 98.
- SCHÜLKE, M. (1998c): Zwei Neufunde für Sachsen-Anhalt (Staphylinidae). - Ent. Bl. (Krefeld) **94**, 126.
- STIPPICH, G. & S. KROOSS (1998): Auswirkungen von Extensivierungsmaßnahmen auf Spinnen, Laufkäfer und Kurzflügler, in: GEROWITT, B. & M. WILDENHEYN (Hrsg.): Ökologische und ökonomische Auswirkungen von Extensivierungsmaßnahmen im Ackerbau. - Göttingen.
- SZALLIES, A. (1998): Bemerkenswerte Käfer aus Baden-Württemberg (2). - Mitt. ent. Ver. Stuttgart (Stuttgart) **33**, 47-52.
- UHLIG, M. & F. C. F. STERRENBURG (1990): Die Gattung *Erichsonius* FAUVEL (Coleoptera, Staphylinidae) in den Niederlanden. - Ent. Bl. (Krefeld) **86**, 166-174.
- WEBER, L. (1903): Verzeichnis der bei Cassel in einem Umkreis von ungefähr 25 Kilometer aufgefundenen Coleopteren. - Abhandlungen und Bericht XLVIII. des Vereins für Naturkunde zu Kassel über das Vereinsjahr 1902-1903 (Kassel), 97-212.
- WEBER, U. (1996): Käferfunde auf der Südwest-Alb und im Albvorland. - Mitt. ent. Ver. Stuttgart **31**, 95-100.
- WEIGEL, A. (1997): *Scintillatrix dives* und *Litargus balteatus* - zwei neue Arten der Thüringer Käferfauna (Col., Buprestidae, Mycetophagidae). - Ent. Nachr. Ber. (Dresden) **41**, 178.
- WELCH, R. C. (1997): The British species of the genus *Aleochara* GRAVENHORST (Staphylinidae). The Coleopterist **6**, 1-45.
- WINTER, K. (1991): Untersuchungen über die xylobionte Käferfauna in Niedersachsen. - NNA-Berichte (Schneverdingen) **4**, 157-162.
- WOLF, E. (1963): Beiträge zur Käferfauna der Freiburger Bucht und des Kaiserstuhls. - Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N.F. **8**, 431-438.
- WÖLKERLING, H. (1998): Kleine Mitteilungen Nr. 2186: *Calosoma maderae* spp. *europunctatum* (HERBST) im östlichen Niedersachsen. - Ent. Bl. (Jena) **94**, 99.
- WURST, C. (1986): *Lytta vesicatoria* L. (Col., Meloidae). Kleine Mitteilung 80. - Mitt. ent. Ver. Stuttgart **21**, 47-48.
- WURST, C. (1989): Bemerkenswerte Käferfunde in Baden-Württemberg. - Mitt. ent. Ver. Stuttgart **24**, 58.
- WURST, C. (1990): *Globicornis fasciatus* Fairm. (Col., Dermestidae). Kleine Mitteilung 123. - Mitt. ent. Ver. Stuttgart **25**, 143.
- WURST, C. (1993): Ein gutes halbes Dutzend *Ampedus*-Erstmeldungen für Baden-Württemberg nebst einem Neufund für Voralberg (Coleoptera: Elateridae). - Mitt. ent. Ver. Stuttgart **28**, 43-45.
- Anschrift des Verfassers:
Frank Köhler
Strombergstraße 22a
D-53332 Bornheim
Frank.Koehler@online.de
- Anm.:F. Köhler, 25.11.2012: pdf-Fassung des Originalmanuskriptes, erster Entwurf. Layout und Seitenzahlen stimmen nicht mit der publizierten Version überein. Ggf. können auch durch die Korrektur in 2000 inhaltliche Veränderungen entstanden sein.
- Zitat der Veröffentlichung:
KÖHLER, F. (2000b): Erster Nachtrag zum Verzeichnis der Käfer Deutschlands. - Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) **44**, 60-84.